

天然药物鉴定技术习题集

说明：A1 型题（最佳选择题。在 5 个备选答案中选择 1 项作为正确答案）；B1 型题（共用备选答案单选题。每道试题由 A、B、C、D、E 5 个备选答案与 2 个或 2 个以上的题干组成，5 个备选答案在前，题干在后，答题时，要求为每个题干选择 1 项作为正确答案。每个备选答案可选 1 次或 1 次以上，也可 1 次也不选用。）

总论

A1 型题

1. 中药鉴定取样时，最终抽取的供检验用样品量，一般不得少于检验用量的（ ）
A. 2 倍 B. 3 倍 C. 6 倍 D. 8 倍 E. 9 倍
2. 中药鉴定的一般程序不包括哪项（ ）
A. 检验申请 B. 检品登记 C. 取样 D. 鉴定 E. 鉴定记录及鉴定报告书
3. 中药鉴定的经典四大鉴定方法中，具有简单、易行、快速特点的鉴定方法是（ ）
A. 理化鉴定 B. 来源鉴定 C. 生物鉴定 D. 性状鉴定 E. 显微鉴定
4. 除哪项外均为药材性状鉴定的内容（ ）
A. 形状、大小 B. 颜色、质地 C. 表面、断面特征 D. 气、味 E. 色度、膨胀度
5. 我国也是世界第一部药典为（ ）
A. 本草纲目 B. 新修本草 C. 中国药典 D. 吴普本草 E. 中药大辞典
6. 我国最早的一部具有国家药典性质的本草是（ ）
A. 《新修本草》 B. 《本草纲目》 C. 《图经本草》 D. 《开宝本草》 E. 《经史证类备急本草》
7. 我国明代对药学贡献最大的本草著作是（ ）
A. 《神农本草经》 B. 《新修本草》 C. 《本草纲目》 D. 《本草纲目拾遗》 E. 《证类本草》
8. 《本草纲目》的作者（ ）
A. 神农氏 B. 陶弘景 C. 赵学敏 D. 苏敬 E. 李时珍
9. 成书于东汉末年的《神农本草经》共收载药物（ ）
A. 378 种 B. 700 种 C. 765 种 D. 365 种 E. 280 种
10. 川乌的命名是根据（ ）
A. 产地 B. 功能 C. 药用部位 D. 性状 E. 原植物形态
11. 桑枝的命名是根据（ ）
A. 产地 B. 原植物形态 C. 功能 D. 性状 E. 药用部位
12. 续断的命名是根据（ ）
A. 产地 B. 原植物形态 C. 功能 D. 性状 E. 药用部位
13. 益母草的命名是根据（ ）
A. 产地 B. 原植物形态 C. 功能 D. 性状 E. 药用部位
14. 黄连的命名是根据（ ）
A. 产地 B. 原植物形态 C. 功能 D. 性状 E. 药用部位
15. 红花的命名是根据（ ）
A. 产地 B. 原植物形态 C. 功能 D. 性状 E. 药用部位
16. 何首乌的命名是根据（ ）
A. 产地 B. 原植物形态 C. 功能 D. 性状 E. 典故
17. 下面生药中哪一个名字和产地无关（ ）
A. 云苓 B. 关木通 C. 怀地黄 D. 川黄连 E. 何首乌
18. 下面生药中哪一个名字和功效无关（ ）
A. 益母草 B. 决明子 C. 番泻叶 D. 防风 E. 牛膝

19. 下列生药中哪一个的名字和产地无关 ()
- A. 天南星 B. 化橘红 C. 杭白菊 D. 川黄连 E. 广藿香
20. “四大南药”是指 ()
- A. 肉桂、益智、砂仁、槟榔 B. 槟榔、益智、砂仁、巴戟天 C. 肉桂、益智、砂仁、蛤蚧
D. 莪术、槟榔、砂仁、巴戟天 E. 白豆蔻、益智、砂仁、蛤蚧
21. “四大怀药”包括 ()
- A. 怀牛膝、地黄、山药、菊花 B. 怀牛膝、地黄、山药、红花 C. 怀牛膝、地黄、山药、芫花
D. 怀牛膝、地黄、山药、金银花 E. 怀牛膝、玄参、天花粉、菊花
22. 我国现行《中华人民共和国药典》为哪年版 ()
- A. 1995 B. 2000 C. 2005 D. 2010 E. 2015
23. 关于《中华人民共和国药典》，下列说法正确的是 ()
- A. 在中国范围内具有法律约束力 B. 新版发行，旧版仍可使用 C. 在全球范围内具有法律约束力
D. 目前使用的是第八版 E. 不定期修订
24. 可用微量升华法鉴定的药材是 ()
- A. 大黄 B. 黄连 C. 白芷 D. 三七 E. 人参
25. 下列叙述中，哪项不是天然药物鉴定的取样原则 ()
- A. 药材总包件数在 5~100 件的，随机取样 5 件 B. 100~1000 件，按 5% 取样
C. 超过 1000 件的，按 1% 取样 D. 不足 5 件的，逐件取样
E. 贵重药材，不论包件多少均逐件取样
26. 根据天然药物的取样原则，一批贵重药材共 400 件，则取样的件数为 ()
- A. 4 件 B. 5 件 C. 20 件 D. 40 件 E. 400 件
27. 根据天然药物的取样原则，一批药材共 4000 件，则取样的件数为 ()
- A. 30 件 B. 40 件 C. 80 件 D. 200 件 E. 4000 件
28. 显微观察中，最常用的透化剂是 ()
- A. 水 B. 稀甘油 C. 香柏油 D. 乙醇 E. 水合氯醛

B1 型题

(1-2 题共用备选答案)

- A. 随机抽取 B. 按 1% 比例取样 C. 按 5% 比例取样
D. 超过部分按 1% 比例取样 E. 不论包件多少均逐件取样
1. 《中国药典》规定，同批药材包件中抽取供检验用样品的原则是，100-1000 件 ()
2. 《中国药典》规定，同批药材包件中抽取供检验用样品的原则是，超过 1000 件 ()

(3-7 题共用备选答案)

- A. 大黄 B. 黄芪 C. 三七 D. 当归 E. 党参
3. 云南主产的药材为 ()
4. 青海主产的药材为 ()
5. 内蒙古主产的药材为 ()
6. 甘肃主产的药材为 ()
7. 山西主产的药材为 ()

(8-12 题共用备选答案)

- A. 星点 B. 金井玉栏 C. 朱砂点 D. 菊花心 E. 油点
8. 黄芪断面有 ()
9. 白芍断面有 ()
10. 苍术断面有 ()
11. 大黄根茎断面有 ()
12. 当归断面有 ()

(13-17 题共用备选答案)

A. 粉性 B. 松泡 C. 角质 D. 油润 E. 柴性

13. 郁金断面显 ()

14. 柴胡断面显 ()

15. 山药断面显 ()

16. 南沙参断面显 ()

17. 当归断面显 ()

(18-22 题共用备选答案)

A. 乌梅 B. 薄荷 C. 枸杞子 D. 酸枣仁 E. 穿心莲

18. 味极苦的药材是 ()

19. 味辛凉的药材是 ()

20. 味酸的药材是 ()

21. 味甜的药材是 ()

22. 味微苦的药材是 ()

根及根茎类药材

A1 型题

1. 单子叶植物与双子叶植物根的区别在于 ()

A. 单子叶植物根多为须根系，而双子叶植物根多为直根系

B. 单子叶植物根最外层较粗，而双子叶植物根最外层较光滑

C. 单子叶植物根断面呈放射状，而双子叶植物根断面无放射状结构

D. 单子叶植物根形成层环纹多明显，双子叶植物根内皮层环较明显

E. 单子叶植物根中心无髓，而双子叶植物根中央有髓

2. 双子叶植物根茎的性状特征是 ()

A. 表面常具有鳞片或鳞毛，有的根茎上密布叶柄残基 B. 外表有木栓层

C. 内皮层明显 D. 断面不呈放射状结构 E. 中央无髓

3. 狗脊的药用部位为 ()

A. 根及根茎 B. 根茎 C. 根 D. 块根 E. 块茎

4. 药材大黄根茎断面的“星点”分布于 ()

A. 皮层 B. 韧皮部 C. 韧皮部及皮部 D. 木栓层 E. 髓部

5. 《中国药典》规定细辛的入药部位是 ()

A. 全草 B. 地上部分 C. 根 D. 根茎 E. 根及根茎

6. 川芎的性状特征是 ()

A. 根茎呈纺锤形，稍扭曲 B. 表面深褐色，粗糙皱缩 C. 体轻，质硬而脆，易折断

D. 断面散有黄棕色小油点，可见波状形成层环纹 E. 有浓郁香气，味甘、辛，微苦

7. 中药材附子来源于 ()

A. 毛茛科植物乌头的主根 B. 毛茛科植物北乌头的主根 C. 毛茛科植物北乌头子根的加工品

D. 毛茛科植物乌头子根的加工品 E. 毛茛科植物草乌的块根

8. 下列对白芍的形状和表面颜色描述正确的是 ()

A. 圆柱形，表面浅红棕色或类白色 B. 圆柱形，表面黄棕色 C. 圆锥形，表面黄棕色

D. 圆锥形，表面黄白色 E. 纺锤形，表面浅黄棕色

9. 味连的原植物为 ()

A. 雅连 B. 黄连 C. 云南黄连 D. 三角叶黄连 E. 峨眉野连

10. 光果甘草、胀果甘草为甘草的 ()

A. 正品 B. 伪品 C. 加工品 D. 代用品 E. 混淆品

11. 当归主产于下列哪个省 ()
A. 东北三省 B. 山东 C. 陕西 D. 甘肃 E. 四川
12. 延胡索的来源是 ()
A. 毛茛科, 根茎 B. 罂粟科, 块茎 C. 豆科, 根 D. 唇形科, 块根 E. 百合科, 根
13. 表面灰黄色, 断面黄白色, 散有棕黄色油点, 气清香, 味甘、微辛, 嚼之略带黏性的中药材是 ()
A. 当归 B. 白芷 C. 苍术 D. 白术 E. 党参
14. “金包头”是形容哪种药材的性状特征 ()
A. 党参 B. 藁本 C. 知母 D. 银柴胡 E. 射干
15. 防风产量最大、质量最好的地方是 ()
A. 内蒙古 B. 黑龙江 C. 陕西省 D. 四川省 E. 青海省
16. 哪项是描述松贝的性状鉴别特征 ()
A. 鳞茎扁球形, 外层鳞叶 2 瓣, 较大而肥厚, 略呈肾形, 相互抱合
B. 鳞茎外层单瓣肥厚鳞叶, 略呈新月形
C. 鳞茎呈类扁球形, 外层鳞叶 2 瓣, 大小相近, 相对抱合, 顶端多开裂
D. 鳞茎呈长圆锥形, 表面类白色或浅棕黄色, 有的具棕色斑点, 外侧鳞叶大小相近, 顶端裂开而略尖
E. 鳞茎呈类圆锥形或近球形, 外层鳞叶 2 瓣, 大小悬殊, 大瓣紧抱小瓣, 未抱部分呈新月形, 顶端闭合, 底部平, 微凹入
17. 以下哪味中药不是来源于豆科 ()
A. 苦参 B. 葛根 C. 黄芪 D. 山豆根 E. 地黄
18. 杭白芷与白芷性状上最大的区别是 ()
A. 根的形状 B. 外表颜色 C. 皮孔样横向突起, 排列成近四纵行 D. 质地 E. 气味
19. 丹参的表面颜色为 ()
A. 浅黄白色 B. 黄棕色 C. 橙红色 D. 棕红色或暗棕红色 E. 黄褐色、灰棕色
20. 鲜地黄断面可见 ()
A. 星点 B. 菊花心 C. 橘红色油点 D. 棕色油室 E. 黄色树脂道
21. 下列哪种药材的皮部横向断裂露出木部, 形似连珠 ()
A. 胡黄连 B. 巴戟天 C. 桔梗 D. 白术 E. 紫菀
22. 木香主产于 ()
A. 四川 B. 云南 C. 江西 D. 广西 E. 浙江
23. 根呈枯骨形, 表面黄棕色, 具有皱纹, 断面可见棕色形成层环并散有褐色点状油室的药材是 ()
A. 党参 B. 桔梗 C. 木香 D. 白术 E. 苍术
24. 下列选项中属于新疆紫草特征的是 ()
A. 根呈不规则长纺锤形 B. 表面红棕色, 皮部紧凑, 不易剥落 C. 质坚实, 不易折断
D. 断面较整齐, 纤维性强 E. 气特异, 味微苦、涩
25. 下列描述牛膝性状特征正确的是 ()
A. 断面浅黄棕色或浅红棕色, 显粉性, 皮部有 4-11 个类圆形异常维管束环列, 气微, 味微苦且甘涩
B. 断面淡棕色, 角质样, 周围有 2-4 轮黄白色小点, 气微, 味微甜而稍苦涩
C. 断面黄白色或浅黄棕色, 木部隆起, 形成多个凸起的同心性环轮, 气微, 味稍甜, 久嚼麻舌
D. 断面浅黄色或棕黄色, 有多数橘黄色小点排列成数轮同心环, 气微, 味甜
E. 断面类白色, 显粉性或角质样, 气微, 味微甘
26. 天麻的原植物来源及入药部位为 ()
A. 兰科, 块茎 B. 兰科, 根 C. 兰科, 根茎 D. 姜科, 块茎 E. 姜科, 根茎
27. 下列选项不属于川贝母法定来源的是 ()
A. 暗紫贝母 B. 梭砂贝母 C. 瓦布贝母 D. 湖北贝母 E. 太白贝母
28. 药材玄参的断面颜色为 ()

- A. 黑色 B. 白色 C. 黄色 D. 红色 E. 棕色
29. “虎皮斑”是形容哪种药材的性状特征（ ）
A. 大贝 B. 珠贝 C. 松贝 D. 青贝 E. 炉贝
30. 药材射干的性状鉴别特征是（ ）
A. 纺锤形，表面暗黄色，具有圆形微凹的须根痕 B. 表面黄棕色，有稀疏的纵纹
C. 不规则结节状，断面黄色，颗粒性 D. 断面黄棕色，显粉性
E. 不规则结节状拳形团块，断面可见波状环纹
31. 黄丝郁金与姜黄的区别是（ ）
A. 同科不同属植物 B. 不同科植物 C. 同属不同种植物
D. 同种植物，药用部位不同 E. 不同植物，药用部位相同
32. 断面中间有 4-10 个明显的类白色点状维管束排列成环，中央灰黑色，味极苦的中药材是（ ）
A. 赤芍 B. 苦参 C. 胡黄连 D. 三七 E. 羌活
33. 具有“糟皮粉渣”特征的中药材是（ ）
A. 大黄 B. 白芍 C. 赤芍 D. 甘草 E. 前胡
34. 下列有关远志性状特征描述正确的是（ ）
A. 呈圆锥形，稍弯曲 B. 全体有较深而密的横皱纹，略呈结节状
C. 体重，质坚实，不易折断 D. 皮部与木部不易分离 E. 气微，味苦，嚼之麻舌
35. 具有“珍珠盘”和“砂眼”的药材是（ ）
A. 人参 B. 党参 C. 银柴胡 D. 紫菀 E. 射干
36. 黄芩的药用部位为（ ）
A. 根及根茎 B. 根 C. 根茎 D. 块根 E. 块茎
37. 皮部具有异常维管束的药材是（ ）
A. 何首乌 B. 大黄 C. 川牛膝 D. 商陆 E. 桔梗
38. 《中国药典》规定知母来源于（ ）
A. 百合科植物知母的干燥根 B. 百合科植物知母的干燥根茎
C. 伞形科植物知母的干燥根及根茎 D. 毛茛科植物知母的干燥根
E. 桔梗科植物知母的干燥根茎
39. 下列哪种中药茎痕周围密布麻点状根痕（ ）
A. 川贝母 B. 延胡索 C. 半夏 D. 天麻 E. 附子
40. 川乌断面的多角形环纹是（ ）
A. 纤维层 B. 内皮层 C. 外皮层 D. 石细胞环带 E. 形成层
41. 药材党参的主产地是（ ）
A. 河南 B. 内蒙古 C. 山东 D. 甘肃 E. 新疆
42. 白及来源于下列哪个科（ ）
A. 姜科 B. 百合科 C. 兰科 D. 菊科 E. 毛茛科
43. 天麻的主产地是（ ）
A. 黑龙江、吉林、辽宁 B. 山东、甘肃 C. 山西、陕西
D. 四川、云南、贵州 E. 广东、福建
44. 北沙参的植物来源是（ ）
A. 毛茛科 B. 伞形科 C. 豆科 D. 桔梗科 E. 莎草科
45. 下列关于白芷说法正确的是（ ）
A. 菊科植物 B. 主产云南、广西 C. 药用部位为根
D. 香气浓郁，味微苦、涩 E. 气微，味苦而微甜
46. 表面无节和节间，内皮层环纹明显，维管束辐射型，中央有髓部。此药材为（ ）
A. 双子叶植物根 B. 单子叶植物根 C. 双子叶植物根茎

- D. 单子叶植物根茎 E. 蕨类植物根茎
47. 双子叶植物根类中药维管束的主要类型是 ()
 A. 周木型维管束 B. 周韧型维管束 C. 辐射型维管束
 D. 有限外韧型维管束 E. 无限外韧型维管束
48. 单子叶植物根茎断面可见一圈环纹为 ()
 A. 内皮层 B. 石细胞环带 C. 木质部 D. 形成层 E. 髓部
49. 绵马贯众根茎及叶柄残基断面的维管束为 ()
 A. 1 个, 呈“U”字形 B. 2~4 个, 环列 C. 17~21 个, 环列
 D. 5~13 个, 环列 E. 2 个, 呈“八”字形
50. 细辛的药用部位是 ()
 A. 全草 B. 根及根茎 C. 带根全草 D. 叶 E. 根茎
51. 细辛的气味为 ()
 A. 气微, 味苦涩 B. 气微, 味辛辣 C. 气辛香, 味辛辣而麻舌
 D. 气微香, 味苦辛而麻舌 E. 气微香, 味苦而麻舌
52. 口尝大黄时不应该有的特征是 ()
 A. 味苦而微涩 B. 嚼之无渣 C. 嚼之粘牙 D. 有沙粒感 E. 唾液被染成黄色
53. 大黄的主要泻下成分是 ()
 A. 游离蒽醌衍生物 B. 结合性蒽醌衍生物 C. 鞣质类成分 D. 芦荟大黄素 E. 大黄素甲醚
54. 何首乌的味感 ()
 A. 微苦 B. 微苦而甘涩 C. 微苦而涩 D. 微苦而麻舌 E. 微苦而辛
55. 下列根茎类药材中薄壁组织含有间隙腺毛的是 ()
 A. 黄连 B. 细辛 C. 绵马贯众 D. 狗脊 E. 大黄
56. 大黄主要含有的化学成分是 ()
 A. 挥发油 B. 强心苷 C. 香豆素类 D. 蒽醌类 E. 生物碱类
57. 多分枝, 集聚成簇, 常弯曲, 形如鸡爪的黄连是 ()
 A. 味连 B. 雅连 C. 云连 D. 峨眉野连 E. 短萼黄连
58. 味连的特征不包括 ()
 A. 气微, 味极苦 B. 有“过桥” C. 皮层有石细胞
 D. 中柱鞘纤维木化 E. 皮层、中柱鞘及髓部均有大量石细胞
59. 下列以根茎入药的是 ()
 A. 怀牛膝 B. 北豆根 C. 川牛膝 D. 山豆根 E. 银柴胡
60. 甘草的性状特征不包括 ()
 A. 皮孔细小而不明显 B. 两端切面中央稍下陷 C. 外皮松紧不一, 红棕色或灰棕色
 D. 断面略显纤维性, 黄白色, 粉性 E. 味甜而特殊
61. 甘草的粉末特征不包括 ()
 A. 纤维及晶纤维 B. 石细胞 C. 具缘纹孔导管
 D. 木栓细胞 E. 棕色块状物
62. 气微, 味微甜, 嚼之有豆腥味的药材是 ()
 A. 甘草 B. 黄芪 C. 山豆根 D. 苦参 E. 远志
63. 原植物为五加科的药材不包括 ()
 A. 人参 B. 刺五加 C. 西洋参 D. 三七 E. 太子参
64. 在山林野生状态下自然生长的人参, 习称 ()
 A. 园参 B. 水参 C. 红参 D. 野山参 E. 林下参
65. 三七的根茎习称 ()
 A. 春七 B. 冬七 C. 剪口 D. 筋条 E. 芦头

66. 三七的断面颜色是 ()
A. 浅黄白色 B. 淡黄色 C. 灰绿色、黄绿色或灰白色
D. 白色或灰白色 E. 棕红色
67. 当归的气味为 ()
A. 香气浓郁，味苦辛，稍有麻舌感，微回甜 B. 气芳香，味辛，微苦 C. 气香，味微苦而辛
D. 香气特异，苦、辛、微麻舌 E. 香气浓郁，味甘、辛、微苦
68. 黄芩的形状及味感分别为 ()
A. 圆柱形；微苦 B. 圆锥形；味苦 C. 纺锤形；味甘、微苦
D. 圆锥形；味甘、微苦 E. 扭曲的长圆形；味甘
69. 地黄的道地产地是 ()
A. 河北 B. 湖北 C. 河南 D. 湖南 E. 浙江
70. 使生地黄内部变黑的加工方法为 ()
A. 缓缓烘焙 B. 堆放发汗 C. 酒炖 D. 蒸制 E. 染色
71. 党参根头部膨大，有多数疣状突起的茎痕及芽，习称 ()
A. 珍珠盘 B. 蚯蚓头 C. 狮子盘头 D. 云头 E. 钉头
72. 党参根头下有致密的 ()
A. 纵皱纹 B. 纵皱纹 C. 支根痕 D. 环状横纹 E. 皮孔
73. 素花党参又称为 ()
A. 潞党参 B. 西党参 C. 条党参 D. 川党参 E. 台党参
74. 苍术断面散有多数棕红色的点状油室，习称 ()
A. 星点 B. 筋脉点 C. 砂眼 D. 朱砂点 E. 油点
75. 松贝、青贝及栽培品的粉末显微特征不包括 ()
A. 淀粉粒 B. 不定式气孔 C. 螺纹导管 D. 表皮细胞 E. 草酸钙结晶
76. 麦冬的质地为 ()
A. 柔软 B. 柔润 C. 柔韧 D. 质硬 E. 质脆
77. 冬麻的性状特征不包括 ()
A. 顶端有鹦哥嘴 B. 下端有圆脐形疤痕 C. 外表有竹节样横环纹
D. 断面角质明亮，半透明 E. 有残留茎基，断面中空
78. 下列中药中，药用部位不是块茎的是 ()
A. 半夏 B. 香附 C. 天麻 D. 延胡索 E. 泽泻
79. 伪品大黄折断面在紫外光灯下显 () 荧光。
A. 黄色 B. 紫红色 C. 棕色或红棕色 D. 蓝色或蓝紫色 E. 亮紫色
80. 断面散有多数点状油室，习称“朱砂点”，暴露稍久，可析出白色细针状结晶，习称“起霜”或“吐脂”。该药材为 ()
A. 羌活 B. 当归 C. 木香 D. 北苍术 E. 茅苍术
81. 黄连的特征性成分是 ()
A. 小檗碱 B. 黄连碱、表小檗碱 C. 巴马丁 D. 黄连碱、药根碱 E. 木兰碱
82. 善于下气除胀满，为消除胀满的要药是 ()
A. 苍术 B. 厚朴 C. 砂仁 D. 豆蔻 E. 藿香
83. 黄连商品药材略呈圆柱形，其形如蚕，“过桥”较长，顶端有少许残茎，此为 ()
A. 云连 B. 雅连 C. 味连 D. 凤尾连 E. 土黄连
84. 延胡索的主要镇痛、镇静成分为 ()
A. 延胡索甲素 B. 延胡索乙素 C. 延胡索丙素 D. 延胡索丁素 E. 小檗碱
85. 《中国药典》规定大青叶来源于 ()
A. 蔷薇科 B. 马鞭草科 C. 蓼科 D. 十字花科 E. 毛茛科

86. 附子的商品规格有（ ）
 A. 盐附子、黑顺片、白附片 B. 泥附子、盐附子、白附子 C. 盐附子、白附子、黑顺片
 D. 黑顺片、白顺片、盐附子 E. 泥附子、白附子、黑顺片
87. 生药肉桂来源于（ ）
 A. 蓼科 B. 豆科 C. 樟科 D. 菊科 E. 木兰科
88. 加工时刮去外皮，置沸水中煮至透心的药材是（ ）
 A. 防己 B. 赤芍 C. 黄连 D. 延胡索 E. 白芍
89. 中药煎法里的“先煎”的目的是为了增加药物的溶解度，或降低药物的毒性，或充分发挥疗效。下面生药在煎煮时需要“先煎”的是（ ）
 A. 砂仁 B. 辛夷 C. 附子 D. 肉桂 E. 番泻叶
90. 具清热燥湿、泻火解毒功效的生药是（ ）
 A. 牛膝 B. 附子 C. 白芍 D. 黄连 E. 牡丹皮
91. 微量升华试验，可见黄色针状、羽毛状结晶，遇碱变红的是（ ）
 A. 大黄 B. 黄连 C. 黄柏 D. 黄芪 E. 姜黄
92. 大青叶、板蓝根、青黛的共同功效是（ ）
 A. 清热解毒，燥湿 B. 清热解毒，利湿 C. 清热解毒，凉血
 D. 清热解毒，活血止痛 E. 清热解毒，利水消肿
93. 除哪一项外，均为板蓝根的功效（ ）
 A. 外感发热 B. 温毒发斑 C. 咽喉肿痛 D. 活血止痛 E. 丹毒
94. 大黄用以攻下通便，应选用（ ）
 A. 生大黄后下 B. 生大黄先煎 C. 熟大黄 D. 酒炙大黄 E. 大黄炭
95. 下列药物中，哪组药物具有回阳救逆的功效（ ）
 A. 附子、干姜 B. 干姜、肉桂 C. 附子、肉桂
 D. 吴茱萸、附子 E. 肉桂、吴茱萸
96. “行血中气滞，气中血滞，专治一身上下诸痛”的药物是（ ）
 A. 川芎 B. 郁金 C. 延胡索 D. 姜黄 E. 乳香
97. 来源于同一种植物的药物是（ ）
 A. 桑叶与桑寄生 B. 柴胡与银柴胡 C. 肉桂与桂枝 D. 羌活与独活 E. 茯苓与猪苓
98. 商品南板蓝根来源于（ ）
 A. 爵床科的马蓝 B. 十字花科的菘蓝 C. 蓼科的蓼蓝
 D. 马鞭草科的路边青 E. 十字花科的欧菘蓝
99. 商品板蓝根来源于（ ）
 A. 爵床科的马蓝 B. 十字花科的菘蓝 C. 蓼科的蓼蓝
 D. 马鞭草科的路边青 E. 十字花科的欧菘蓝
100. 除哪项外均为味连的性状特征（ ）
 A. 多单枝，圆柱型，“过桥”长 B. 表面黄褐色，有结节状隆起及须根痕
 C. 断面不整齐，木部鲜黄色或橙黄色 D. 有放射状纹理，中央有髓 E. 气微，味极苦
101. 下列中药中，来源于毛茛科的是（ ）
 A. 白芍 B. 葛根 C. 马钱子 D. 茅苍术 E. 半夏
102. 以下药材来源于毛茛科的是（ ）
 A. 干姜 B. 葛根 C. 川乌 D. 龙胆 E. 当归
103. 药材去尽外皮后表面颜色为表面黄棕色，气清香，味苦涩，嚼之有沙砾感，并能够使唾液染成黄色。该药材是（ ）
 A. 黄连 B. 黄芩 C. 黄柏 D. 大黄 E. 牛黄
104. 大黄根茎横切面上髓部环列或散在的暗红色的星芒状小点，称为（ ）

- A. 朱砂点 B. 星点 C. 菊花点 D. 盲点 E. 锦纹
105. 称为“将军”的中药是（ ）
- A. 黄连 B. 黄芩 C. 黄柏 D. 大黄 E. 牛黄
106. 黄连为（ ）科植物的干燥根茎，所含的主要有效成分为（ ）。
- A. 毛茛科、小檗碱 B. 毛茛科、芦丁 C. 蓼科、小檗碱 D. 芸香科、木质素 E. 蓼科、蒽醌类
107. 进口西洋参的主要产地是（ ）
- A. 朝鲜 B. 日本 C. 印度 D. 美国、加拿大 E. 韩国
108. 下列哪项不为野山参的性状特征（ ）
- A. 雁脖芦 B. 枣核芦 C. 铁线纹 D. 蚯蚓头 E. 珍珠须
109. 调和诸药，解百药毒的中药指的是（ ）
- A. 石膏 B. 当归 C. 金银花 D. 甘草 E. 绿豆
110. “鹦哥嘴”或“红小瓣”是形容哪个药材的性状鉴别特征（ ）
- A. 白及 B. 知母 C. 防风 D. 黄精 E. 天麻
111. 具有“铜皮铁骨”、味先苦而后微甜的中药是（ ）
- A. 人参 B. 三七 C. 西洋参 D. 牛黄 E. 虎杖
112. 牛膝与川牛膝的原植物均为（ ）
- A. 蓼科 B. 毛茛科 C. 蔷薇科 D. 苋科 E. 茜草科
113. 甘草的气味是（ ）
- A. 气微，味甜而特殊 B. 气微，味微甜，嚼之微有豆腥气 C. 气辛香，味辛辣、麻舌
- D. 气微，味微苦而酸 E. 香气浓郁，味苦、辛，稍麻舌，微回甜

B1 型题

(1-2 题共用备选答案)

- A. 辐射型维管束 B. 周韧型维管束 C. 周木型维管束
- D. 有限外韧型维管束 E. 无限外韧型维管束

1. 单子叶植物根茎的维管束类型为（ ）
2. 双子叶植物根茎的维管束类型为（ ）

(3-4 题共用备选答案)

- A. 气微，味微苦而酸 B. 香气浓郁，味苦、辛，稍麻舌，微回甜 C. 气辛香，味辛辣、麻舌
- D. 气微，味微甜，嚼之微有豆腥气 E. 气微，味甜而特殊
3. 川芎的气味是（ ）
4. 黄芪的气味是（ ）

(5-6 题共用备选答案)

- A. 味连 B. 雅连 C. 云连 D. 峨眉野连 E. 短萼黄连
5. 根茎多分枝，集聚成簇，形似鸡爪；单枝呈不规则结节状隆起，有“过桥”和鳞叶，断面木部鲜黄色或橙黄色，呈放射状的药材是（ ）
6. 多单枝，长而较直，过桥长的药材是（ ）

(7-8 题共用备选答案)

- A. 薯蓣科植物薯蓣 B. 薯蓣科植物山薯 C. 葫芦科植物栝楼或双边栝楼
- D. 豆科植物甘葛藤 E. 豆科植物野葛
7. 药材粉葛来源于（ ）
8. 药材葛根来源于（ ）

(9-10 题共用备选答案)

- A. 柴胡 B. 大叶柴胡 C. 狭叶柴胡 D. 竹叶柴胡 E. 兴安柴胡
9. 《中国药典》规定，北柴胡来源于（ ）
10. 《中国药典》规定，南柴胡来源于（ ）

(11-12 题共用备选答案)

A. 天冬 B. 山药 C. 半夏 D. 郁金 E. 白及

11. 药材块茎呈不规则扁圆形，有 2-3 个爪状分枝的是 ()

12. 药材块根呈长圆形，表面有皱纹，断面角质样，内皮层环纹明显的是 ()

(13-14 题共用备选答案)

A. 浙江、湖北 B. 福建、四川 C. 云南、广西 D. 甘肃、青海 E. 黑龙江、吉林、辽宁

13. 白术主产于 ()

14. 人参主产于 ()

(15-16 题共用备选答案)

A. 多角形 B. 类圆形 C. “V” 字形排列 D. 略方形 E. 波状

15. 白芷的形成层环呈 ()

16. 杭白芷的形成层环呈 ()

(17-18 题共用备选答案)

A. 何首乌 B. 柴胡 C. 商陆 D. 川芎 E. 苍术

17. “朱砂点”是形容哪种药材的性状特征 ()

18. “罗盘纹”是形容哪种药材的性状特征 ()

(19-20 题共用备选答案)

A. 节 B. 芦头 C. 芦碗 D. 珍珠疙瘩 E. 铁线纹

19. 人参的根茎习称 ()

20. 人参根茎上的凹窝状茎痕习称 ()

(21-22 题共用备选答案)

A. 党参 B. 柴胡 C. 大黄 D. 白芍 E. 白芷

21. “狮子盘头”是种药材的性状鉴别特征 ()

22. “疙瘩芋”是哪种药材的性状鉴别特征 ()

(23-24 题共用备选答案)

A. 鳞茎扁球形，外层鳞叶 2 瓣，较大而肥厚，略呈肾形，相互抱合

B. 茎外层单瓣肥厚鳞叶，略呈新月形

C. 茎呈类圆锥形或近球形，外层鳞叶 2，大小悬殊，大瓣紧抱小瓣，未抱部分呈新月形，顶端闭合，底部平，微凹入

D. 鳞茎呈类扁球形，外层鳞叶 2 瓣，大小相近，相对抱合，顶端多开裂

E. 鳞茎呈长圆锥形，表面类白色或浅棕黄色，有的具棕色斑点，外侧鳞叶大小相近，顶端裂开而略尖

23. 青贝的性状鉴别特征是 ()

24. 炉贝的性状鉴别特征是 ()

(25--26 题共用备选答案)

A. 黑龙江、吉林 B. 甘肃、山东 C. 河南 D. 云南 E. 重庆、四川

25. 地黄的道地产区是 ()

26. 三七的道地产区是 ()

(27-28 题共用备选答案)

A. 龙胆 B. 坚龙胆 C. 严龙胆 D. 苏龙胆 E. 苦龙胆

27. 根圆柱形，上部多有显著横皱纹，断面木部色较浅的药材是 ()

28. 原植物为滇龙胆的是 ()

(29-30 题共用备选答案)

A. 兰科 B. 石竹科 C. 毛茛科 D. 伞形科 E. 菊科

29. 独活原植物的科名是 ()

30. 羌活原植物的科名是 ()

(31-32 题共用备选答案)

A. 根 B. 根茎 C. 根及根茎 D. 块茎 E. 鳞茎

31. 紫菀的入药部位为 ()

32. 桔梗的入药部位为 ()

(33-34 题共用备选答案)

A. 葫芦科 B. 苋科 C. 毛茛科 D. 蓼科 E. 豆科

33. 苦参来源于 ()

34. 牛膝来源于 ()

(35-36 题共用备选答案)

A. 白及 B. 半夏 C. 银柴胡 D. 郁金 E. 麦冬

35. 药用部位纺锤形，表面黄白色至淡黄色，半透明，对光视可见一条不透明细木心的中药材是 ()

36. 药用部位呈不规则扁圆形，表面灰白色或黄白色，以茎痕为中心有数圈同心环节的中药材是 ()

(37-38 题共用备选答案)

A. 大黄 B. 黄芪 C. 人参 D. 三七 E. 泽泻

37. 内蒙古主产的重要道地药材是 ()

38. 青海主产的重要道地药材是 ()

(39-40 题共用备选答案)

A. 防己 B. 木香 C. 白芍 D. 川贝母 E. 远志

39. 质坚体重，断面可见棕色环和油点，气香浓烈的是 ()

40. 断面灰白色，平坦，富粉性，具“车轮纹”的是 ()

(41-42 题共用备选答案)

A. 党参 B. 防风 C. 白头翁 D. 柴胡 E. 玄参

41. 具有“狮子头”的药材是 ()

42. 具有“蚯蚓头”的药材是 ()

茎木类药材

A1 型题

1. 木材是指 ()

A. 草本植物茎形成层以外的部分 B. 木本植物茎除去周皮或表皮剩下的部分

C. 木本植物茎形成层以外的部分 D. 木本植物茎形成层以内的部分

E. 草本植物茎形成层以内的部分

2. 药用部位是心材的药材是 ()

A. 川木通 B. 木通 C. 钩藤 D. 苏木 E. 大血藤

3. 大血藤区别于鸡血藤的重要性状鉴别特征是 ()

A. 有偏心性髓 B. 横断面皮部呈红棕色，有数处向内嵌入木部

C. 木质部与韧皮部相间排列呈偏心性半圆形的环 D. 具多层同心性环纹 E. 有菊花心

4. 密花豆是下列哪种药材的原植物 ()

A. 大血藤 B. 鸡血藤 C. 川木通 D. 沉香 E. 降香

5. 髓小，偏向一侧的药材是 ()

A. 川木通 B. 大血藤 C. 鸡血藤 D. 苏木 E. 降香

6. 下列哪项不是苏木的性状特征 ()

A. 呈圆柱形或对剖半圆柱形 B. 表面黄红色至棕红色 C. 具刀削痕

D. 年轮明显 E. 质柔软

7. 来源于瑞香科的药材是 ()

A. 苏木 B. 川木通 C. 通草 D. 大血藤 E. 沉香

8. 断面有黄白色放射状纹理及裂隙，其间布满导管孔的药材是（ ）
 A. 降香 B. 沉香 C. 苏木 D. 鸡血藤 E. 川木通
9. 表面紫红色或红褐色，切面有致密纹理的药材是（ ）
 A. 鸡血藤 B. 木通 C. 沉香 D. 降香 E. 苏木
10. 主产于广东、广西、云南等省的中药是（ ）
 A. 木通 B. 大血藤 C. 降香 D. 苏木 E. 沉香
11. 木通来源于（ ）
 A. 毛茛科 B. 豆科 C. 木通科 D. 瑞香科 E. 五加科
12. 下列哪项不属于沉香的性状特征（ ）
 A. 表面凹凸不平 B. 有刀削痕 C. 质较坚实，断面刺状
 D. 燃烧时香气浓，有油渗出 E. 气特异，刺鼻
13. 髓部黄白色海绵状或中空的药材是（ ）
 A. 钩藤 B. 木通 C. 沉香 D. 川木通 E. 降香
14. 苏木的热水浸液加酸后显（ ）
 A. 红色 B. 黄色 C. 绿色 D. 蓝色 E. 红棕色
15. 沉香药用部位来源于瑞香科白木香及沉香的（ ）
 A. 边材 B. 茎髓 C. 含树脂的心材 D. 腐烂的心材 E. 茎藤
16. 煎服钩藤时应该用下列哪种煎煮方法（ ）
 A. 后下 B. 溶化 C. 包煎 D. 先煎 E. 泡服

B1 型题

(1-2 题共用备选答案)

- A. 苏木 B. 川木通 C. 鸡血藤 D. 大血藤 E. 钩藤

1. 来源于茜草科的药材是（ ）
 2. 来源于木通科的药材是（ ）

(3-4 题共用备选答案)

- A. 豆科 B. 瑞香科 C. 五加科 D. 毛茛科 E. 木通科

3. 降香来源于（ ）
 4. 川木通来源于（ ）

(5-6 题共用备选答案)

- A. 呈方柱形 B. 呈长圆柱形、半圆柱形或不规则块状
 C. 呈椭圆形、长矩圆形或不规则形的斜切片 D. 呈圆柱形，常稍扭曲 E. 呈圆柱形或类方柱形
5. 钩藤的形状为（ ）
 6. 木通的形状为（ ）

皮类药材

A1 型题

1. 来源于樟科的药材是（ ）
 A. 厚朴 B. 桑白皮 C. 地骨皮 D. 肉桂 E. 香加皮
2. 呈卷筒状或槽状，少数呈不规则块片状，外表面灰棕色或黄棕色，栓皮松软常呈鳞片状，易剥落的药材是（ ）
 A. 牡丹皮 B. 厚朴 C. 秦皮 D. 香加皮 E. 关黄柏
3. 来源于豆科的药材是（ ）
 A. 合欢皮 B. 牡丹皮 C. 肉桂 D. 桑白皮 E. 关黄柏
4. 药材杜仲来源于（ ）
 A. 杜仲科 B. 五加科 C. 蓼科 D. 木兰科 E. 樟科

5. 黄柏主产于 ()
A. 辽宁、吉林 B. 广东、广西 C. 四川、贵州 D. 云南、西藏 E. 内蒙古、甘肃
6. 厚朴的主产地是 ()
A. 湖北、四川 B. 河南、河北 C. 江苏、湖北 D. 广西、江苏 E. 河北、山西
7. 来源于萝藦科的药材是 ()
A. 黄柏 B. 肉桂 C. 香加皮 D. 杜仲 E. 厚朴
8. 下列哪种植物不是药材秦皮的原植物 ()
A. 苦枥白蜡树 B. 对节白蜡树 C. 白蜡树 D. 尖叶白蜡树 E. 宿柱白蜡树
9. 来源于毛茛科的药材是 ()
A. 地骨皮 B. 牡丹皮 C. 合欢皮 D. 香加皮 E. 桑白皮
10. 药材关黄柏来源于 ()
A. 大戟科 B. 五加科 C. 木兰科 D. 芸香科 E. 豆科
11. 习称“川黄柏”药材的原植物是 ()
A. 黄皮树 B. 黄檗 C. 酸橙 D. 橘 E. 枳
12. 五加皮来源于 ()
A. 樟科 B. 木犀科 C. 桑科 D. 五加科 E. 芸香科
13. 桑白皮的药用部位是 ()
A. 根皮 B. 干皮 C. 枝皮 D. 干皮或枝皮 E. 根皮和干皮
14. 主产于安徽、四川的药材是 ()
A. 牡丹皮 B. 桑白皮 C. 杜仲 D. 肉桂 E. 合欢皮
15. 药材黄柏的断面特征是 ()
A. 纤维性强，撕裂时有白色粉末飞出 B. 较平坦，粉性 C. 不平坦，颗粒性
D. 有银白色、富弹性的胶丝相连 E. 纤维性，呈裂片状分层
16. 秦皮的水浸出液在日光下显 ()
A. 浅黄棕色荧光 B. 污绿色荧光 C. 蓝紫色荧光 D. 棕红色荧光 E. 碧蓝色荧光
17. 味苦，嚼之有粘性，可使唾液染成黄色的药材是 ()
A. 厚朴 B. 肉桂 C. 黄柏 D. 牡丹皮 E. 杜仲
18. 内表面紫棕色或深紫褐色，划之显油痕的药材是 ()
A. 牡丹皮 B. 厚朴 C. 肉桂 D. 杜仲 E. 秦皮
19. 折断时有细密银白色富弹性的胶丝的药材是 ()
A. 肉桂 B. 杜仲 C. 厚朴 D. 桑白皮 E. 秦皮
20. 地骨皮的药用部位为 ()
A. 干皮 B. 枝皮 C. 根皮 D. 枝皮和干皮 E. 干皮、枝皮和根皮
21. 以皮厚，肉细，油性足，内表面色紫棕而有发亮结晶状物，香气浓，渣少者为佳的药材是 ()
A. 牡丹皮 B. 黄柏 C. 秦皮 D. 厚朴 E. 杜仲
22. 主要成分是小檗碱的药材是 ()
A. 黄柏 B. 杜仲 C. 肉桂 D. 厚朴 E. 五加皮
23. 地骨皮来源于 ()
A. 桑科桑的根皮 B. 五加科细柱五加的根皮 C. 萝藦科杠柳的根皮
D. 茄科枸杞的根皮 E. 木犀科白蜡树的根皮

B1 型题

(1-2 题共用备选答案)

- A. 呈扭曲的卷筒状、槽状或板片状 B. 呈卷筒状或半筒状 C. 为长条状块片
D. 呈半筒状或浅槽状 E. 呈不规则块片状
1. 药材桑白皮的形状为 ()

2. 药材合欢皮的形状为 ()

(3-4 题共用备选答案)

- A. 明显的椭圆形皮孔 B. 横向突起的皮孔 C. 灰白色圆点状皮孔
D. 横向长圆形皮孔 E. 方形皮孔

3. 肉桂表面有 ()

4. 秦皮表面有 ()

(5-6 题共用备选答案)

- A. 白色或淡黄白色 B. 黄绿色或黄白色 C. 红棕色
D. 灰黄色至棕黄色 E. 黄绿色或淡黄棕色

5. 地骨皮的外表面颜色为 ()

6. 关黄柏的外表面颜色为 ()

(7-8 题共用备选答案)

- A. 气微, 味微甘 B. 气芳香, 味苦而涩 C. 气香浓烈, 味甜辣
D. 气香, 味辛辣、微苦 E. 气微, 味稍苦, 嚼之有胶状感

7. 杜仲的气味是 ()

8. 厚朴的气味是 ()

叶类药材

A1 型题

1. 同药材板蓝根、青黛均源于相同原植物的药材是 ()

- A. 侧柏叶 B. 番泻叶 C. 大青叶 D. 蓼大青叶 E. 紫苏叶

2. 叶脉浅黄棕色, 于下表面略突起, 叶柄扁平, 偶带膜质托叶鞘的药材是 ()

- A. 番泻叶 B. 大青叶 C. 蓼大青叶 D. 枇杷叶 E. 淫羊藿

3. 呈披针形或长卵形, 略卷曲, 叶端短尖或微突, 叶基不对称, 两面均有细短毛茸的药材是 ()

- A. 狭叶番泻叶 B. 尖叶番泻叶 C. 耳叶番泻叶 D. 大青叶 E. 淫羊藿

4. 主产于印度和埃及的药材是 ()

- A. 番泻叶 B. 大青叶 C. 蓼大青叶 D. 枇杷叶 E. 淫羊藿

5. 叶基部下延至叶柄呈翼状的药材是 ()

- A. 罗布麻叶 B. 蓼大青叶 C. 大青叶 D. 淫羊藿 E. 紫苏叶

6. 大青叶主产于 ()

- A. 四川、江苏 B. 广东、广西 C. 河北、陕西 D. 云南、黑龙江 E. 江苏、西藏

7. 下列哪个药具有泻下作用 ()

- A. 枇杷叶 B. 艾叶 C. 侧柏叶 D. 番泻叶 E. 大青叶

8. 下列哪种药材来自唇形科 ()

- A. 番泻叶 B. 侧柏叶 C. 桑叶 D. 罗布麻叶 E. 紫苏叶

9. 主含结合性蒽醌类成分的药材是 ()

- A. 侧柏叶 B. 大青叶 C. 桑叶 D. 枇杷叶 E. 番泻叶

B1 型题

(1-2 题共用备选答案)

- A. 夹竹桃科 B. 十字花科 C. 蓼科 D. 蔷薇科 E. 小檗科

1. 枇杷叶来源于 ()

2. 淫羊藿来源于 ()

(3-4 题共用备选答案)

- A. 小檗科 B. 菊科 C. 豆科 D. 十字花科 E. 蓼科

3. 番泻叶原植物来源于 ()

4. 蓼大青叶原植物来源于 ()

(5-6 题共用备选答案)

A. 叶片呈披针形 B. 三出复叶，顶生小叶基部心形 C. 叶片呈长椭圆形至长圆状倒披针形
D. 叶片呈长椭圆形至长圆状披针形 E. 叶片呈长圆形或倒卵形

5. 淫羊藿的性状特征是 ()

6. 枇杷叶的性状特征是 ()

花类药材

A1 型题

1. 体轻，放水中则漂浮水面，易附于手指上的药材是 ()

A. 蒲黄 B. 辛夷 C. 款冬花 D. 槐花 E. 西红花

2. 外形呈研棒状的药材是 ()

A. 辛夷 B. 丁香 C. 款冬花 D. 金银花 E. 蒲黄

3. 药材款冬花来源于 ()

A. 木兰科 B. 忍冬科 C. 五加科 D. 香蒲科 E. 菊科

4. 呈长圆棒状，外面被有多数鱼鳞状苞片，内表面密被白色絮状茸毛的药材是 ()

A. 蒲黄 B. 丁香 C. 款冬花 D. 西红花 E. 辛夷

5. 花萼钟状，黄绿色，先端 5 浅裂，雄蕊 10，其中 9 个基部连合的药材是 ()

A. 蒲黄 B. 槐花 C. 款冬花 D. 西红花 E. 红花

6. 药材呈棒状，表面黄白色或绿白色(贮久色渐深)，密被短柔毛的是 ()

A. 金银花 B. 蒲黄 C. 款冬花 D. 西红花 E. 红花

7. 形似毛笔头，苞片外表面密被茸毛，气芳香的药材是 ()

A. 辛夷 B. 丁香 C. 款冬花 D. 槐花 E. 红花

8. 入药部位为带花果穗的药材是 ()

A. 望春花 B. 夏枯草 C. 洋金花 D. 丁香 E. 款冬花

9. 在花类中药鉴定中，具有重要鉴定意义的是 ()

A. 子房 B. 花粉粒 C. 柱头 D. 花托 E. 萼片

10. 洋金花的花冠形状为 ()

A. 管状 B. 钟状 C. 喇叭状 D. 蝶形 E. 圆球形

11. 略呈研棒状，具 4 枚三角形萼片的药材是 ()

A. 丁香 B. 金银花 C. 洋金花 D. 西红花 E. 夏枯草

12. 似毛笔头，花梗上有类白色点状皮孔 ()

A. 玉兰 B. 武当玉兰 C. 望春花 D. 丁香 E. 金银花

13. 花粉粒众多，黄色，球形或三角形，外壁表面有细密短刺及圆形细颗粒状雕纹，具 3 个萌发孔 ()

A. 西红花 B. 金银花 C. 松花粉 D. 蒲黄 E. 红花

14. 含有绿原酸、具清热解毒作用的药材是 ()

A. 丁香 B. 金银花 C. 洋金花 D. 西红花 E. 夏枯草

15. 花浸入水中，水染成金黄色 ()

A. 丁香 B. 金银花 C. 洋金花 D. 红花 E. 夏枯草

16. 红花粉末中可见 ()

A. 圆形油细胞 B. 长管道状分泌细胞 C. 油室 D. 乳管 E. 黏液细胞

17. 辛夷的药用部位 ()

A. 完整的花 B. 花蕾 C. 未开放的花序 D. 已开放的花序 E. 花粉

18. 气芳香浓烈，味辛辣，有麻舌感的药材是 ()

A. 辛夷 B. 蒲黄 C. 红花 D. 金银花 E. 丁香

19. 取少许药材，浸入水中，可见柱头膨胀成长喇叭状，水被染成黄色的是（ ）

A. 洋金花 B. 番红花 C. 菊花 D. 槐花 E. 丁香

20. 采摘红花的最佳时期是（ ）

A. 花冠呈黄色时 B. 花冠呈红色时 C. 花冠由黄色变红色时 D. 花冠枯萎时
E. 花冠由红色变黄色时

B1 型题

(1-2 题共用备选答案)

A. 四川、湖北 B. 广东、西藏 C. 坦桑尼亚、马来西亚
D. 尼日尼亚、加拿大 E. 山东、河南

1. 金银花的主产地是（ ）

2. 丁香的主产地是（ ）

(3-4 题共用备选答案)

A. 花蕾及花 B. 花柱 C. 柱头 D. 花粉 E. 花序

3. 槐花的药用部位是（ ）

4. 菊花的药用部位是（ ）

(5-6 题共用备选答案)

A. 茄科 B. 豆科 C. 忍冬科 D. 香蒲科 E. 菊科

5. 药材洋金花来源于（ ）

6. 药材蒲黄来源于（ ）

(7-8 题共用备选答案)

A. 气芳香浓烈，味辛辣，有麻舌感 B. 气微香，味微苦 C. 气芳香，味淡、微涩
D. 气特异，微有刺激性，味微苦 E. 气微，味淡

7. 红花的气味是（ ）

8. 西红花的气味是（ ）

(9-10 题共用备选答案)

A. 花柱 B. 柱头 C. 花粉 D. 花蕾 E. 已开放的花序

9. 西红花的药用部位是（ ）

10. 丁香的药用部位是（ ）

果实与种子类药材

A1 型题

1. 伞形科植物果实显微特征中可见（ ）

A. 镶嵌细胞 B. 托叶鞘 C. 茎方形 D. 荚果 E. 花冠深 5 裂

2. 以果实入药的药材是（ ）

A. 川楝子 B. 苦杏仁 C. 酸枣仁 D. 马钱子 E. 沙苑子

3. 呈扁心形，表面黄棕色至深棕色，一端尖，另端钝圆，左右不对称，尖端一侧有短线形种脐，圆端合点处向上具多数深棕色脉纹的药材是（ ）

A. 沙苑子 B. 金樱子 C. 桃仁 D. 苦杏仁 E. 砂仁

4. 主产于江西清江、新干的道地药材是（ ）

A. 小茴香 B. 金樱子 C. 豆蔻 D. 枳壳 E. 沙苑子

5. 呈长卵形至卵形，稍扁，表面有不规则的纵纹及多数突起的小斑点，两面各有一条明显的纵沟，顶端尖锐，基部有小果梗或已脱落的药材是（ ）

A. 连翘 B. 沙苑子 C. 小茴香 D. 决明子 E. 山茱萸

6. 药材马钱子来源于（ ）

A. 车前科植物的成熟果实 B. 车前科植物的成熟种子 C. 马钱科植物的近成熟果实

- D. 马钱科植物的成熟种子 E. 马钱科植物的成熟果实
7. 呈长圆形，多纵剖成两半的药材是（ ）
- A. 五味子 B. 葶苈子 C. 木瓜 D. 马钱子 E. 豆蔻
8. 枳壳的入药部位为（ ）
- A. 外层果皮 B. 近成熟种子 C. 成熟种子 D. 未成熟果实 E. 成熟果实
9. 种子略呈肾形而稍扁，表面光滑，边缘一侧微凹处具圆形种脐的是（ ）
- A. 南五味子 B. 沙苑子 C. 槟榔 D. 川楝子 E. 砂仁
10. 药材南五味子的原植物是（ ）
- A. 华中五味子 B. 五味子 C. 华南五味子 D. 西南五味子 E. 东北五味子
11. 一端较平坦，另端斜尖，背腹面各有 1 条突起棱线，棱线两侧各有 1 条斜向对称而色较浅的线性凹纹，子叶 2，呈“S”形折曲并重叠的药材是（ ）
- A. 补骨脂 B. 牵牛子 C. 决明子 D. 砂仁 E. 苦杏仁
12. 种子的种皮和外胚乳的折合层不规则地伸入内胚乳，形成错入组织的是（ ）
- A. 吴茱萸 B. 沙苑子 C. 槟榔 D. 酸枣仁 E. 栀子
13. 药材原植物为扁茎黄芪的是（ ）
- A. 黄芪 B. 川黄芪 C. 蒙古黄芪 D. 沙苑子 E. 金樱子
14. 五味子主产于（ ）
- A. 辽宁、黑龙江 B. 四川、云南 C. 河南、沈阳 D. 西藏、新疆 E. 江苏、浙江
15. 顶端有五角星状裂隙的药材是（ ）
- A. 川楝子 B. 吴茱萸 C. 五味子 D. 苦杏仁 E. 山茱萸
16. 药材形状为不规则片状或囊状的是（ ）
- A. 豆蔻 B. 巴豆 C. 山茱萸 D. 决明子 E. 马钱子
17. 有关绿壳砂描述正确的是（ ）
- A. 来源于姜科植物海南砂 B. 种子集结成团，具三钝棱 C. 气微，味微酸
- D. 种子团分成 5 瓣 E. 主产于广东
18. 下列对枳壳气味描述正确的是（ ）
- A. 气微，味涩、微苦 B. 气芳香浓烈，味辛凉、微苦 C. 气微，味微酸
- D. 有特异香气，味微甜、辛 E. 气清香，味苦、微酸
19. 药材南葶苈子来源于（ ）
- A. 十字花科播娘蒿的种子 B. 十字花科独行菜的种子 C. 十字花科播娘蒿的果实
- D. 十字花科独行菜的果实 E. 十字花科独行菜的种仁
20. 形状略似花瓶，全身被突起刺状小点的药材是（ ）
- A. 马钱子 B. 枸杞子 C. 栀子 D. 金樱子 E. 川楝子
21. 主产地为海南的药材是（ ）
- A. 槟榔 B. 补骨脂 C. 马钱子 D. 吴茱萸 E. 栀子
22. 气微，味甜，以宁夏中宁产质优的药材是（ ）
- A. 枸杞子 B. 栀子 C. 巴豆 D. 山茱萸 E. 五味子
23. 药材马钱子的性状特征是（ ）
- A. 呈不规则的片状或囊状，表面紫红色至紫黑色，皱缩
- B. 呈椭圆形或卵圆形，具不明显的三钝棱，外表棕褐色
- C. 呈纺锤形或椭圆形，表面鲜红色或暗红色，具不规则皱纹
- D. 纽扣状圆板形，表面密被灰棕或灰绿色绢状茸毛
- E. 呈扁圆形或圆锥形，外表淡黄棕色或淡红棕色，粗糙，具稍凹下的网状浅沟纹
24. 外果皮散有油细胞的药材是（ ）
- A. 小茴香 B. 山楂 C. 枳壳 D. 补骨脂 E. 五味子

25. 果实表面红色、紫红色或暗红色，有的表面呈黑红色或出现“白霜”，果肉柔软，味酸的药材是（ ）
A. 乌梅 B. 山楂 C. 瓜蒌 D. 五味子 E. 吴茱萸
26. 具有收敛固涩，益气生津，补肾宁心功能的中药材是（ ）
A. 乌梅 B. 五味子 C. 西洋参 D. 山茱萸 E. 酸枣仁
27. 取药材数粒，加水共研，产生苯甲醛特殊香气的药材是（ ）
A. 决明子 B. 五味子 C. 马钱子 D. 砂仁 E. 苦杏仁
28. 药材为纵剖对半的长圆形，外表面紫红色或红棕色，有不规则的深皱纹，剖面边缘向内卷曲，果肉红棕色，种子扁长三角形，多脱落。气微清香，味酸微涩。该中药是（ ）
A. 金樱子 B. 决明子 C. 木瓜 D. 沙苑子 E. 葶苈子
29. 功能舒筋活络，和胃化湿。善于治疗暑湿吐泻，腿疼转筋的药材是（ ）
A. 砂仁 B. 木瓜 C. 马钱子 D. 菟丝子 E. 韭菜子
30. 外果皮红色，有灰白色小斑点；果肉深黄色至浅棕色，中部横切片具5粒浅黄色果核，但核多脱落而中空，气微清香，味酸、微甜的中药材是（ ）
A. 木瓜 B. 五味子 C. 枸杞子 D. 山楂 E. 栀子
31. 下列不是决明子的特征的是（ ）
A. 略呈菱形或短圆柱形，两端平行倾斜 B. 表面绿棕色或暗棕色，平滑有光泽
C. 背腹面各有1条突起的棱线 D. 质坚硬，易破碎 E. 子叶2，黄色，呈“S”形折曲并重叠
32. 下列不是小茴香的特征的是（ ）
A. 为双悬果 B. 横切面略呈五边形 C. 分果背面有纵棱5条
D. 分果横切面有油管5个 E. 胚乳细胞含多数糊粉粒
33. 一药材粉末装片能观察到油管碎片、镶嵌细胞、网纹细胞等，该药材是（ ）
A. 砂仁 B. 小茴香 C. 五味子 D. 马钱子 E. 苦杏仁
34. 连翘采收熟透的果实称为（ ）
A. 青翘 B. 熟翘 C. 老翘 D. 绿翘 E. 黄翘
35. 某药材呈纽扣状圆板形，密被自中间向四周呈辐射状排列有丝样光泽的灰棕或灰绿色绢状茸毛，该药材是（ ）
A. 沙苑子 B. 酸枣仁 C. 蛇床子 D. 牛蒡子 E. 马钱子
36. 果实有不明显的三棱，表面密生刺状突起，果皮薄而软，种子集结成团，具三钝棱，中有白色隔膜，将种子团分成3瓣，气芳香而浓烈。该药材是（ ）
A. 益智 B. 小茴香 C. 栀子 D. 豆蔻 E. 砂仁
37. 呈扁球状五角星形，外被宿存花被的果实种子类中药材是（ ）
A. 栀子 B. 豆蔻 C. 地肤子 D. 木瓜 E. 木鳖子
38. 呈扁圆形，表面黑色或红黑色，光亮的药材是（ ）
A. 王不留行 B. 青葙子 C. 车前子 D. 补骨脂 E. 牵牛子
39. 来源于蔷薇科植物华东覆盆子的干燥果实的是（ ）
A. 苦杏仁 B. 乌梅 C. 木瓜 D. 山楂 E. 覆盆子
40. 呈类球形或扁球形，表面乌黑色或棕黑色，皱缩不平，果核表面有凹点，味极酸的药材是（ ）
A. 五味子 B. 乌梅 C. 金樱子 D. 山楂 E. 覆盆子
41. 下列哪个是吴茱萸的正品（ ）
A. 臭辣子 B. 华南吴茱萸 C. 马桑子 D. 石虎 E. 楝叶吴茱萸
42. 果实呈球形或略呈五角状扁球形，顶端有五角星状的裂隙，气芳香浓郁的药材是（ ）
A. 地肤子 B. 吴茱萸 C. 蔓荆子 D. 补骨脂 E. 蛇床子
43. 呈椭圆形或卵圆形，具5条纵棱，形似杨桃，横切面多呈五角星形的药材是（ ）
A. 地肤子 B. 吴茱萸 C. 栀子 D. 小茴香 E. 使君子
44. 双悬果呈椭圆形，分果背面有5条突起纵棱的药材是（ ）

- A. 砂仁 B. 薏苡仁 C. 牵牛子 D. 地肤子 E. 蛇床子
45. 呈长倒卵形，略扁，微弯曲，表面灰褐色，带紫黑色斑点的药材是（ ）
- A. 金樱子 B. 鹤虱 C. 女贞子 D. 牛蒡子 E. 蔓荆子
46. 断面可见棕色种皮与白色胚乳相间的大理石样花纹的药材有（ ）
- A. 鸡血藤 B. 大血藤 C. 川木通 D. 槟榔 E. 防己
47. 种子呈扁圆形或扁椭圆形，表面紫红色或紫褐色，平滑有光泽。有的两面均呈圆隆状突起；有的
一面较平坦，中间有 1 条隆起的纵线纹，另一面稍突起。该种子是（ ）
- A. 桃仁 B. 苦杏仁 C. 沙苑子 D. 酸枣仁 E. 菟丝子
48. 种子水浸后膨胀呈海绵状，该药材是（ ）
- A. 车前子 B. 葶苈子 C. 胖大海 D. 牵牛子 E. 菟丝子
49. 用开水浸泡，表面有黏性，加热至种皮破裂时露出白色卷旋状的胚的中药材是（ ）
- A. 五味子 B. 决明子 C. 菟丝子 D. 葶苈子 E. 车前子
50. 下列哪个中药来源于禾本科植物的种仁（ ）
- A. 肉豆蔻 B. 酸枣仁 C. 桃仁 D. 苦杏仁 E. 薏苡仁
51. 下列属于果实类药材的是（ ）
- A. 五味子 B. 车前子 C. 葶苈子 D. 莱菔子 E. 菟丝子
52. 下列属于种子类药材的是（ ）
- A. 五味子 B. 栀子 C. 女贞子 D. 枸杞子 E. 决明子

B1 型题

(1-2 题共用备选答案)

- A. 呈卵圆形，表面灰黄色或色稍深，纵线 6 条，顶端平截，基部有果柄痕
- B. 呈扁球形或扁椭圆形，表面紫红色或紫褐色，平滑有光泽，有的显裂纹
- C. 呈不规则的片状或囊状，表面紫红色至紫黑色，顶端可见圆形宿痕，基部有果梗痕
- D. 呈长卵圆形或椭圆形，表面红黄色或棕红色，具有 6 条翅状纵棱，棱间常有 1 条明显的纵脉纹
- E. 呈球形或略呈五角状扁球形，表面暗黄绿色至褐色，顶端有五角星状裂隙，基部残留果梗

1. 酸枣仁的性状特征是（ ）

2. 栀子的性状特征是（ ）

(3-4 题共用备选答案)

- A. 砂仁 B. 五味子 C. 枸杞子 D. 补骨脂 E. 栀子

3. 来源于茄科植物果实的药材是（ ）

4. 来源于茜草科植物果实的药材是（ ）

(5-6 题共用备选答案)

- A. 葫芦科 B. 木犀科 C. 葡萄科 D. 棕榈科 E. 伞形科

5. 小茴香来源于（ ）

6. 槟榔来源于（ ）

(7-8 题共用备选答案)

- A. 河北 B. 江西 C. 广东 D. 宁夏 E. 西藏

7. 砂仁主产于（ ）

8. 枸杞子主产于（ ）

(9-10 题共用备选答案)

- A. 豆科 B. 旋花科 C. 大戟科 D. 菊科 E. 山茱萸科

9. 巴豆来源于（ ）

10. 山茱萸来源于（ ）

(11-12 题共用备选答案)

- A. 木兰科植物干燥成熟种子 B. 木兰科植物干燥成熟果实 C. 鼠李科植物成熟果肉

D. 鼠李科植物成熟种子 E. 鼠李科植物近成熟果实

11. 五味子来源于 ()

12. 酸枣仁来源于 ()

(13-14 题共用备选答案)

A. 吴茱萸 B. 川楝子 C. 阳春砂 D. 小茴香 E. 连翘

13. 气特异, 味酸、苦的药材是 ()

14. 有特异香气, 味微甜、辛的药材是 ()

(15-16 题共用备选答案)

A. 北葶苈子 B. 川楝子 C. 槟榔 D. 小茴香 E. 原豆蔻

15. 味微辛, 遇水黏滑性较强的药材是 ()

16. 气芳香, 味辛凉略似樟脑的药材是 ()

(17-19 题共用备选答案)

A. 小茴香 B. 枸杞子 C. 枳壳 D. 山茱萸 E. 五味子

17. 组织中有油细胞的药材是 ()

18. 组织中有油室的药材是 ()

19. 组织中有油管的药材是 ()

(20-23 题共用备选答案)

A. 山楂 B. 陈皮 C. 枳壳 D. 山茱萸 E. 苦杏仁

20. 药用部位为干燥成熟的果皮的药材是 ()

21. 药用部位为干燥成熟的果实的药材是 ()

22. 药用部位为干燥成熟的果肉的药材是 ()

23. 药用部位为干燥未成熟的果实的药材是 ()

(24-28 题共用备选答案)

A. 先煎 B. 后下 C. 烊化 D. 包煎 E. 泡服

24. 苦杏仁生品入煎剂需要 ()

25. 车前子入煎剂需要 ()

26. 葶苈子入煎剂需要 ()

27. 砂仁入煎剂需要 ()

28. 胖大海的服用方法是 ()

(29-33 题共用备选答案)

A. 广东 B. 安徽 C. 江西 D. 宁夏 E. 山东

29. 枳壳主产于 ()

30. 枸杞子主产于 ()

31. 木瓜主产于 ()

32. 砂仁主产于 ()

33. 陈皮主产于 ()

(34-38 题共用备选答案)

A. 芸香科 B. 木犀科 C. 伞形科 D. 姜科 E. 豆科

34. 化橘红来源于 ()

35. 连翘来源于 ()

36. 小茴香来源于 ()

37. 益智来源于 ()

38. 决明子来源于 ()

全草类药材

A1 型题

1. 药材紫花地丁来源于（ ）
A. 堇菜科植物的全草 B. 堇菜科植物的地上部分 C. 堇菜科植物的肉质茎
D. 报春花科植物的全草 E. 报春花科植物的地上部分
2. 穿心莲来源于（ ）
A. 爵床科 B. 五加科 C. 唇形科 D. 菊科 E. 伞形科
3. 气微，味极苦的药材是（ ）
A. 石斛 B. 紫花地丁 C. 金钱草 D. 穿心莲 E. 淡竹叶
4. 主根长圆锥形，叶基生，灰绿色，展平后叶片呈披针形或卵状披针形，先端钝，基部截形或稍心形，边缘具钝锯齿，两面有毛的药材是（ ）
A. 槲寄生 B. 紫花地丁 C. 桑寄生 D. 石斛 E. 广藿香
5. 青蒿的原植物是（ ）
A. 青蒿 B. 邪蒿 C. 艾蒿 D. 黄花蒿 E. 茵陈蒿
6. 平行叶脉，具横行小脉，形成长方形网格状的药材是（ ）
A. 麻黄 B. 石斛 C. 金钱草 D. 青蒿 E. 淡竹叶
7. 药材石斛来源于（ ）
A. 菊科 B. 兰科 C. 马钱科 D. 唇形科 E. 伞形科
8. 药材荆芥的气味特征是（ ）
A. 气芳香，味微涩而辛凉 B. 气芳香，味甜 C. 气微，味淡
D. 气微，味苦 E. 有特异香气，味极苦
9. 来源于禾本科的药材是（ ）
A. 穿心莲 B. 石斛 C. 肉苁蓉 D. 淡竹叶 E. 青蒿
10. 轮伞花序腋生的药材是（ ）
A. 荆芥 B. 青蒿 C. 石斛 D. 益母草 E. 穿心莲
11. 主产于广东湛江、肇庆的药材是（ ）
A. 麻黄 B. 广藿香 C. 穿心莲 D. 石斛 E. 薄荷
12. 常缠结成团，无毛或被疏柔毛，茎扭曲，表面棕色或暗棕红色，叶片用水浸后，对光透视可见黑色或褐色条纹的药材是（ ）
A. 金钱草 B. 广金钱草 C. 广藿香 D. 穿心莲 E. 益母草
13. 金钱草来源于（ ）
A. 唇形科 B. 堇菜科 C. 报春花科 D. 蔷薇科 E. 三白草科
14. 气孔特异，保卫细胞侧面观呈哑铃形或电话听筒形的中药材是（ ）
A. 细辛 B. 广藿香 C. 金钱草 D. 穿心莲 E. 麻黄
15. 麻黄的药用部位是（ ）
A. 种子 B. 叶 C. 花 D. 果实 E. 草质茎
16. 下列哪项不是麻黄或其炮制品的作用（ ）
A. 发汗散寒 B. 宣肺平喘 C. 利水消肿 D. 润肺止咳 E. 固表止汗
17. 下列哪项是金钱草的正品来源（ ）
A. 过路黄 B. 聚花过路黄 C. 点腺过路黄 D. 连钱草 E. 广金钱草
18. 下列哪项不是薄荷的鉴别特征（ ）
A. 茎呈方柱形 B. 髓部中空 C. 轮伞花序腋生 D. 有特殊清凉香气 E. 叶互生
19. 肉苁蓉为（ ）
A. 列当科植物的根 B. 列当科植物的根茎 C. 列当科植物带鳞叶的肉质茎
D. 列当科带叶柄残基的根茎 E. 兰科植物的干燥地上草质茎

20. 茎方柱形，表面紫棕色或淡绿色，叶对生，具短柄，叶片多卷缩或破碎，完整者展平后呈卵形或长椭圆形，上表面深绿色，下表面灰绿色，轮伞花序，叶揉搓时有特异清凉香气，味辛凉。此药材为（ ）

A. 麻黄 B. 鱼腥草 C. 白花蛇舌草 D. 益母草 E. 薄荷

21. 下列哪项不是鲜石斛的特征（ ）

A. 表面黄绿色 B. 节明显 C. 有膜质叶鞘 D. 肉质多汁 E. 味苦，嚼之有黏性

22. 呈螺旋形或弹簧状，通常有 2~6 个旋纹的石斛叫（ ）

A. 铁皮枫斗 B. 铁皮石斛 C. 金钗石斛 D. 鼓槌石斛 E. 流苏石斛

23. 叶片先端钝，基部截形或稍心形，边缘具钝锯齿；蒴果椭圆形或 3 裂，分果瓣船形的中药材是（ ）

A. 紫花地丁 B. 鱼腥草 C. 蒲公英 D. 车前草 E. 垂盆草

24. 下列不是来源于唇形科的药材有（ ）

A. 广藿香 B. 益母草 C. 薄荷 D. 穿心莲 E. 荆芥

25. 功能活血调经，为妇产科常用的药材是（ ）

A. 广藿香 B. 薄荷 C. 益母草 D. 香薷 E. 半边莲

26. 下列哪种药材不具备清热解毒的作用（ ）

A. 半枝莲 B. 紫花地丁 C. 半边莲 D. 青蒿 E. 蒲公英

27. 叶片具明显弧形脉 5~7 条；穗状花序数条；能清热利尿通淋的药材是（ ）

A. 瞿麦 B. 泽兰 C. 车前草 D. 佩兰 E. 淡竹叶

28. 含青蒿素的植物是（ ）

A. 茵陈蒿 B. 牧蒿 C. 黄花蒿 D. 滨蒿 E. 邪蒿

29. 来源于菊科的是（ ）

A. 金钱草 B. 小蓟 C. 淡竹叶 D. 紫花地丁 E. 鱼腥草

B1 型题

(1-2 题共用备选答案)

- A. 少分枝，触之微有粗糙感，膜质鳞叶裂片 2(稀 3)，锐三角形，先端反曲
- B. 少分枝，无粗糙感，膜质鳞叶裂片 2(稀 3)，锐三角形，先端反曲
- C. 多分枝，有粗糙感，膜质鳞叶裂片 3(稀 2)，先端锐尖，断面髓部三角状圆形
- D. 多分枝，无粗糙感，膜质鳞叶裂片 2(稀 3)，上部为短三角形，先端多不反曲
- E. 多分枝，无粗糙感，膜质鳞叶裂片 3(稀 2)，上部为短三角形，先端多不反曲

1. 草麻黄的性状特征是（ ）

2. 木贼麻黄的性状特征是（ ）

(3-4 题共用备选答案)

- A. 河南、河北 B. 海南、江西 C. 广东、广西
- D. 广西、贵州、四川 E. 黑龙江、吉林、辽宁

3. 穿心莲的主产地是（ ）

4. 石斛的主产地是（ ）

(5-6 题共用备选答案)

- A. 青蒿 B. 金钱草 C. 薄荷 D. 肉苁蓉 E. 益母草

5. 茎方柱形，表面紫棕色或淡绿色，棱角处具茸毛，髓部中空的药材是（ ）

6. 茎圆柱形，表面棕黄色或黄绿色，具纵棱线，断面中部有髓的药材是（ ）

(7-8 题共用备选答案)

- A. 呈扁圆柱形 B. 呈粗纺锤形 C. 呈长圆柱形 D. 呈螺旋形或弹簧状 E. 呈方柱形

7. 药材金钗石斛的形状是（ ）

8. 药材流苏石斛的形状是（ ）

(9-10 题共用备选答案)

A. 肉苁蓉 B. 石斛 C. 穿心莲 D. 桑寄生 E. 广藿香

9. 茎枝呈圆柱形，表面红褐色或灰褐色，有多数细小突起的棕色皮孔的药材是 ()

10. 呈扁圆柱形，稍弯曲，表面棕褐色或灰棕色，密被覆瓦状排列的肉质鳞叶的药材是 ()

(11-12 题共用备选答案)

A. 长条形 B. 类纺锤形、扁纺锤形 C. 不规则块状 D. 常缠结成团 E. 扁圆柱形

11. 药材管花肉苁蓉的形状是 ()

12. 药材肉苁蓉的形状是 ()

(13-14 题共用备选答案)

A. 干燥草质茎 B. 干燥全草 C. 干燥地上部分 D. 干燥带叶茎枝 E. 干燥茎叶

13. 荆芥的入药部位为 ()

14. 益母草的入药部位为 ()

(15-16 题共用备选答案)

A. 草茵陈 B. 土茵陈 C. 绵茵陈 D. 花茵陈 E. 西茵陈

15. 春季采收的茵陈习称 ()

16. 秋季采收的茵陈习称 ()

(17-20 题共用备选答案)

A. 薄荷 B. 荆芥 C. 鱼腥草 D. 广藿香 E. 穿心莲

17. 搓碎后有鱼腥气，味涩的是 ()

18. 气微，味极苦的是 ()

19. 气香特异，味微苦的是 ()

20. 揉搓后有特殊清凉香气，味辛凉的是 ()

(21-25 题共用备选答案)

A. 黄连 B. 黄芩 C. 大黄 D. 金银花 E. 马钱子

21. 主要成分是番木鳖碱的是 ()

22. 主要成分是绿原酸的是 ()

23. 主要成分是黄酮化合物的是 ()

24. 主要成分是小檗碱的是 ()

25. 主要成分是蒽醌类化合物的是 ()

藻菌地衣类药材

A1 型题

1. 下列以藻体入药的药材是 ()

A. 茯苓 B. 海藻 C. 松萝 D. 灵芝 E. 冬虫夏草

2. 呈类球形、椭圆形或不规则团块，表面棕色至黑褐色，体重，质坚实的药材是 ()

A. 松萝 B. 灵芝 C. 猪苓 D. 冬虫夏草 E. 茯苓

3. 下列对灵芝的描述不正确的是 ()

A. 来源于多孔菌科紫芝或赤芝 B. 入药部位为菌核 C. 皮壳边缘薄，常向内卷曲

D. 气微香，味苦涩 E. 外形呈伞状，菌盖肾形

4. 冬虫夏草主产于 ()

A. 四川、贵州等地 B. 山西、青海等地 C. 四川、青海等地

D. 陕西、甘肃等地 E. 安徽、云南等地

5. 冬虫夏草的药用部位为 ()

A. 子座 B. 子实体 C. 幼虫尸体 D. 子座和幼虫尸体的复合体 E. 孢子

6. 下列哪一项不是冬虫夏草的性状特征 ()

- A. 虫体形如蚕 B. 外表土黄色，环纹明显 C. 足 8 对，前部 5 对明显
D. 质脆易断，断面略平坦 E. 子座细长圆柱形
7. 茯苓中抗肿瘤的有效成分是（ ）
A. 茯苓多糖 B. 茯苓次聚糖 C. 茯苓酸 D. 麦角甾醇 E. 齿孔酸
8. 具有杀虫作用的中药是（ ）
A. 雷丸 B. 茯苓 C. 猪苓 D. 冬虫夏草 E. 昆布
9. 茯苓的加工方法是（ ）
A. 晒干 B. 发汗 C. 蒸干 D. 煮后晒干 E. 烘干
10. 下列哪项不是猪苓的形状特点（ ）
A. 呈不规则条形、类圆形或扁块状 B. 表面灰黑色或棕褐色
C. 表面皱缩或有瘤状突起 D. 断面略呈颗粒状 E. 体重质坚实，入水下沉

B1 型题

(1-2 题共用备选答案)

- A. 子实体 B. 菌核 C. 地衣体 D. 子座 E. 菌丝
1. 茯苓的入药部位是（ ）
2. 松萝的入药部位是（ ）

(3-4 题共用备选答案)

- A. 茯苓 B. 松萝 C. 灵芝 D. 猪苓 E. 冬虫夏草
3. 由虫体与从虫头部长出的真菌子座相连而成，虫体似蚕，表面深黄色至黄棕色，有足 8 对中部 4 对较明显的药材是（ ）
4. 呈不规则条形，表面乌黑或棕黑色，有瘤状突起，体轻，质硬的药材是（ ）

(5-9 题共用备选答案)

- A. 子实体 B. 菌核 C. 孢子 D. 虫瘿 E. 煎膏
5. 五倍子的药用部位（ ）
6. 灵芝的药用部位（ ）
7. 海金沙的药用部位（ ）
8. 猪苓的药用部位（ ）
9. 儿茶的药用部位（ ）

树脂类药材

A1 型题

1. 一般认为，树脂是由植物体内哪一类成分经过复杂的化学变化形成的（ ）
A. 黄酮类 B. 生物碱类 C. 木脂素类 D. 萜醌类 E. 挥发油类
2. 下列哪味药材属于油胶树脂（ ）
A. 洋乳香 B. 血竭 C. 乳香 D. 安息香 E. 松香
3. 下列对树脂的通性描述不正确的是（ ）
A. 燃烧时有浓烟或明亮的火焰，并有特殊的香气或臭气 B. 不溶于水，不吸水膨胀
C. 加热容易变软，最后熔融 D. 不溶于乙醇、三氯甲烷等有机溶剂
E. 树脂的乙醇液蒸干，可以形成膜状物质
4. 下列关于血竭药材的性状描述不正确的是（ ）
A. 气微，味极苦 B. 研成细粉血红色 C. 表面暗红色
D. 用火点燃冒烟呛鼻 E. 在热水中软化
5. 下列关于安息香的描述不正确的是（ ）
A. 香树脂类化合物 B. 呈不规则小块，常粘结成团块 C. 表面黄色，无蜡样光泽
D. 质脆，易碎，断面平坦，白色，加热后软化熔融 E. 气芳香，味微辛，嚼之有砂粒感

6. 下列哪项不属于乳香的性状特点 ()
- A. 表面黄白色, 半透明 B. 质脆, 遇热软化 C. 破碎面有玻璃样或蜡样光泽
D. 与水研磨, 形成黄棕色乳状液 E. 加水研磨成白色或黄白色乳状液
7. 某药材颗粒用火隔纸烘烤即熔化, 对光照视呈鲜艳的红色。该药材是 ()
- A. 苏合香 B. 血竭 C. 乳香 D. 松香 E. 没药
8. 血竭的原植物科名是 ()
- A. 豆科 B. 棕榈科 C. 漆树科 D. 百合科 E. 橄榄科
9. 乳香的原植物科名是 ()
- A. 豆科 B. 毛茛科 C. 漆树科 D. 海金沙科 E. 橄榄科
10. 遇水变白, 与水共研成白色或黄白色乳状液的树脂类中药是 ()
- A. 儿茶 B. 没药 C. 血竭 D. 苏合香 E. 乳香
11. 燃烧时发生呛鼻烟气的是 ()
- A. 血竭 B. 冰片 C. 芦荟 D. 儿茶 E. 海金沙

B1 型题

(1-2 题共用备选答案)

- A. 血竭 B. 地丁树或哈地丁树 C. 麒麟竭 D. 白花树 E. 龙血树

1. 没药的原植物是 ()
2. 安息香的原植物是 ()

(3-4 题共用备选答案)

- A. 印度尼西亚及马来西亚等地 B. 广东、广西等地
C. 索马里、埃塞俄比亚及阿拉伯半岛南部 D. 云南、尼泊尔等地 E. 马来西亚、索马里等地
3. 乳香主产于 ()
4. 血竭主产于 ()

其他类药材

A1 型题

1. 海金沙的入药部位是 ()
- A. 花粉 B. 果实 C. 叶上的虫瘿 D. 干燥成熟的孢子 E. 带叶嫩枝的干燥煎膏
2. 为极细的深蓝色粉末, 微有草腥气, 味淡的药材是 ()
- A. 儿茶 B. 五倍子 C. 海金沙 D. 冰片 E. 青黛
3. 下列对药材儿茶的描述不正确的是 ()
- A. 呈方块形或不规则块状 B. 具挥发性 C. 断面有细孔, 遇潮有黏性
D. 无臭, 味苦、涩, 略回甜 E. 表面光滑, 稍有光泽
4. 下列关于五倍子的说法不正确的是 ()
- A. 按照外形分为“角倍”和“肚倍” B. “肚倍”呈长圆形或纺锤形囊状
C. “角倍”呈菱形, 有不规则的钝角状分枝, 被柔毛, 壁较薄 D. 来源于漆树科植物的果实
E. 气特异, 味涩
5. 呈不规则块状, 表面暗红褐色或深褐色, 富吸湿性, 有特异臭气, 味极苦的药材是 ()
- A. 海金沙 B. 青黛 C. 芦荟 D. 血竭 E. 儿茶
6. 具挥发性, 点燃发生浓烟, 并有带光火焰的中药材是 ()
- A. 海金沙 B. 青黛 C. 儿茶 D. 冰片 E. 乳香
7. 加工方法是豁取茎叶, 加入清水, 浸泡至叶腐烂, 捞去茎枝叶渣, 加石灰充分搅拌, 待浸液由乌绿色转变为紫红色时, 捞取液面蓝色泡沫物, 晒干。此药材是 ()
- A. 儿茶 B. 芦荟 C. 海金沙 D. 青黛 E. 冰片
8. 以蓝色均匀、体轻能浮于水面、火烧时产生紫红色烟雾的时间较长者为佳的药材是 ()

- A. 儿茶 B. 五倍子 C. 海金沙 D. 青黛 E. 冰片
9. 火烧能产生紫红色烟雾，含有靛蓝及靛玉红的药材的是（ ）
- A. 板蓝根 B. 青黛 C. 蓼大青叶 D. 大青叶 E. 血竭
10. 以干燥成熟孢子入药的中药材是（ ）
- A. 五倍子 B. 儿茶 C. 青黛 D. 海金沙 E. 冰片
11. 青黛的药用部位为（ ）
- A. 大青叶加工品 B. 花粉 C. 孢子 D. 菌丝 E. 提取物
12. 儿茶的药用部位为（ ）
- A. 虫瘿 B. 菌丝 C. 孢子 D. 花粉 E. 干燥的煎膏
13. 撒在火上，发出轻微爆鸣声且有闪光的药材是（ ）
- A. 海金沙 B. 冰片 C. 青黛 D. 天竺黄 E. 石膏
14. 不同的入药部位可做板蓝根、大青叶、青黛的植物是（ ）
- A. 蓼蓝 B. 菘蓝 C. 马蓝 D. 罗布麻 E. 薄荷
15. 五倍子的入药部位是（ ）
- A. 果实 B. 虫瘿 C. 子实体 D. 菌核 E. 煎膏
16. 下列不具“吸湿性”的药材是（ ）
- A. 天竺黄 B. 芦荟 C. 儿茶 D. 龙骨 E. 鹿角霜

B1 型题

(1-2 题共用备选答案)

- A. 儿茶 B. 海金沙 C. 青黛 D. 冰片 E. 芦荟

1. 来源于海金沙科的药材是（ ）

2. 来源于豆科的药材是（ ）

(3-4 题共用备选答案)

- A. 气微，味淡 B. 微有草腥气 C. 气清香，味辛、凉
D. 气微，微甜而特殊 E. 有特殊臭气，味极苦

3. 冰片的气味是（ ）

4. 芦荟的气味是（ ）

(5-6 题共用备选答案)

- A. 青海、西藏 B. 四川、贵州、云南 C. 云南西双版纳
D. 广东、广西 E. 黑龙江、吉林、辽宁

5. 儿茶主产于（ ）

6. 五倍子主产于（ ）

动物类药材

A1 型题

1. “广地龙”的来源为（ ）

- A. 参环毛蚓 B. 通俗环毛蚓 C. 威廉环毛蚓 D. 栉盲环毛蚓
E. 通俗环毛蚓、威廉环毛蚓、栉盲环毛蚓

2. 下列有关珍珠的描述错误的是（ ）

- A. 来源于珍珠贝科动物马氏珍珠贝、蚌科动物三角帆蚌或褶纹冠蚌
B. 表面类白色，半透明 C. 质地坚硬，破碎面显层纹
D. 表面具有特有的彩色光泽 E. 气微腥，味微咸

3. 牡蛎来源于（ ）

- A. 珍珠贝科 B. 蚌科 C. 牡蛎科 D. 乌贼科 E. 鲍科

4. 蕲蛇尾部末端有一个三角形角质鳞片，习称（ ）

- A. 当门子 B. 剑脊 C. 佛指甲 D. 挂甲 E. 三岔
5. “捻头”是形容哪种药材的性状特征（ ）
A. 花鹿茸 B. 马鹿茸 C. 羚羊角 D. 蛤蚧 E. 地龙
6. 具有特异香气的中药材为（ ）
A. 人工牛黄 B. 珍珠 C. 麝香 D. 蟾酥 E. 蛤蚧
7. 下列有关蛤蚧的描述，正确的是（ ）
A. 头呈扁圆形，有眼睑 B. 吻鳞切鼻孔，有眼睑 C. 无眼睑，吻鳞不切鼻孔
D. 趾底面不具吸盘 E. 五趾均具五趾，趾间无蹼
8. 蛤蚧来源于（ ）
A. 鬲蜥科红点蛤蚧去内脏的干燥体 B. 鬲蜥科西藏蛤蚧去内脏的干燥体
C. 壁虎科多疣壁虎去内脏的干燥体 D. 壁虎科蛤蚧去内脏的干燥体
E. 蝾螈科红瘰疣螈去内脏的干燥体
9. 乌梢蛇的来源为（ ）
A. 眼镜蛇科银环蛇 B. 眼镜蛇科乌梢蛇 C. 眼镜蛇科金环蛇
D. 蝮科五步蛇 E. 游蛇科乌梢蛇
10. 将槽针插入毛壳麝香内撮取麝香，可见（ ）
A. 槽内的麝香仁逐渐膨胀，高出槽面 B. 槽内的麝香仁呈颗粒状
C. 槽内的麝香仁沾于槽壁上 D. 槽内的麝香仁与槽面相平
E. 槽内的麝香仁逐渐干缩
11. 背部黑色或灰黑色，有 45-58 个黑白相间环纹的药材是（ ）
A. 蛤蚧 B. 乌梢蛇 C. 金钱白花蛇 D. 蕲蛇 E. 斑蝥
12. 下列有关牛黄的描述不正确的是（ ）
A. 长在胆囊或胆管中的结石 B. 表面有的有“乌金衣” C. 质地酥脆，易分层剥离
D. 气清香，味先苦而后微甜，有清凉感 E. 断面呈颗粒状
13. 海螵蛸的药用部位为（ ）
A. 卵鞘 B. 贝壳 C. 内壳 D. 幼虫 E. 骨骼
14. “莲花”是指（ ）
A. 具有 1 个侧枝的马鹿茸 B. 具有 1 个侧枝的花鹿茸 C. 具有 2 个侧枝的马鹿茸
D. 具有 2 个侧枝的花鹿茸 E. 具有 3 个侧枝的马鹿茸
15. 取药材粉末少许，加清水调和后涂于指甲上，能将指甲染成黄色的是（ ）
A. 蟾酥 B. 西红花 C. 麝香 D. 红花 E. 牛黄
16. 药材羚羊角来源于（ ）
A. 鹅喉羚羊 B. 斑羚 C. 藏羚羊 D. 赛加羚羊 E. 长尾羚羊
17. 鹿茸为鹿科动物梅花鹿或马鹿的（ ）
A. 未骨化密生茸毛的幼角 B. 雄鹿锯茸后翌年春季脱落的角基 C. 已骨化的角
D. 鹿角熬去胶质后的角块 E. 鹿角熬制的胶块
18. “当门子”是指麝香中（ ）
A. 呈圆形或颗粒状者 B. 毛壳开口处的麝香 C. 毛壳麝香中间的核心
D. 毛壳麝香中外层麝香 E. 以上均不是
19. 其水液可使指甲染黄习称“挂甲”的药材是（ ）
A. 麝香 B. 蟾酥 C. 牛黄 D. 熊胆 E. 鹿茸
20. 有“通天眼”的药材是（ ）
A. 鹿茸 B. 羚羊角 C. 水牛角 D. 石决明 E. 麝香
21. 治疗热病高热，热极生风，惊痫抽搐的要药是（ ）
A. 地龙 B. 羚羊角 C. 钩藤 D. 天麻 E. 全蝎

22. 正品优质麝香仁灰化后 ()
 A. 有毛臭 B. 有肉焦臭 C. 呈白色或灰色残渣 D. 有火焰出现 E. 有火星出现
23. 取某中药少许, 撒于炽热的坩埚上, 初则迸裂, 随即熔化膨胀起泡似珠, 香气浓烈, 灰化后呈白色或灰白色残渣。此中药为 ()
 A. 牛黄 B. 沉香 C. 麝香 D. 雄黄 E. 冰片
24. 阿胶的主产地是 ()
 A. 内蒙 B. 西藏 C. 山东 D. 河北 E. 青海
25. 具有“白颈”的药材是 ()
 A. 水蛭 B. 地龙 C. 全蝎 D. 蜈蚣 E. 僵蚕
26. 具“马头蛇尾瓦楞身”特点的动物类药是 ()
 A. 金钱白花蛇 B. 蕲蛇 C. 僵蚕 D. 乌梢蛇 E. 海马
27. 斑蝥背部的鞘翅特点是 ()
 A. 有一条白色条纹 B. 具红色条纹 C. 具3条黄色纵纹
 D. 具3条黄色横纹 E. 具黑白相间的环纹
28. 为动物的病理产物的药材是 ()
 A. 牛黄 B. 阿胶 C. 水牛角 D. 鹿茸 E. 蝉蜕
29. “银皮”是下列哪种药材的特征 ()
 A. 麝香 B. 鹿茸 C. 牛黄 D. 鸡内金 E. 僵蚕
30. 具有“水波纹”特征的药材是 ()
 A. 麝香 B. 鹿茸 C. 牛黄 D. 羚羊角 E. 水牛角
31. 表面挂有一层黑色光亮的薄膜, 习称“乌金衣”的中药材是 ()
 A. 麝香 B. 鹿茸 C. 牛黄 D. 珍珠 E. 石决明
32. 一动物类药材呈扁平纺锤形, 有多数环节; 前端略尖, 后端钝圆, 两端各具1吸盘, 前吸盘不显著, 后吸盘较大。此药材是 ()
 A. 地龙 B. 水蛭 C. 蜈蚣 D. 僵蚕 E. 蕲蛇
33. 下列哪种药材的磨片在暗视野中可见同心环状的如彩虹般的光环 ()
 A. 石决明 B. 牡蛎 C. 珍珠 D. 蛤壳 E. 瓦楞子
34. 断面沾水即呈乳白色隆起的中药材是 ()
 A. 水蛭 B. 麝香 C. 蟾酥 D. 牛黄 E. 地龙
35. 呈圆盘状, 背部有白色环纹, 背正中明显突起一条脊棱, 脊鳞扩大呈六角形, 尾下鳞单行的中药材是 ()
 A. 海马 B. 海龙 C. 金钱白花蛇 D. 蕲蛇 E. 乌梢蛇
36. 背部两侧各有黑褐色与浅棕色组成的“V”形斑纹17~25个, 习称“方胜纹”的中药材是 ()
 A. 海马 B. 海龙 C. 金钱白花蛇 D. 蕲蛇 E. 乌梢蛇
37. 桑螵蛸的药用部位是 ()
 A. 干燥贝壳 B. 干燥内壳 C. 干燥卵鞘 D. 干燥背甲 E. 干燥分泌物
38. 两侧有对称的肋骨8条, 伸出边缘的中药材是 ()
 A. 石决明 B. 海螵蛸 C. 蛤蚧 D. 龟甲 E. 鳖甲

B1 型题

(1-2 题共用备选答案)

- A. 病理产物 B. 生理产物 C. 干燥全体 D. 去掉内脏的干燥体 E. 动物骨骼

1. 土鳖虫的入药部位是 ()

2. 珍珠的入药部位是 ()

(3-4 题共用备选答案)

- A. 贝壳四方形, 背缘平直, 腹缘圆, 单壳

- B. 贝壳呈长片状，背腹缘几平行，右壳较小，左壳凹陷很深
C. 贝壳呈类三角形，背腹缘呈三角字形，右壳外面淡黄色
D. 贝壳呈圆形、卵形或三角形，右壳较小，表面环生同心鳞片
E. 贝壳呈类三角形，背腹缘呈八字形，右壳外面淡黄色

3. 药材长牡蛎的性状是（ ）

4. 药材大连湾牡蛎的性状是（ ）

(5-6 题共用备选答案)

- A. 小刀螂 B. 大刀螂 C. 薄翅螳 D. 绿污斑螳 E. 巨斧螳螂

5. 黑螳螂的原动物是（ ）

6. 长螳螂的原动物是（ ）

(7-8 题共用备选答案)

- A. 蝥科 B. 鲍科 C. 芫青科 D. 壁虎科 E. 牛科

7. 药材羚羊角的原动物科名是（ ）

8. 药材蕲蛇的原动物科名是（ ）

(9-10 题共用备选答案)

- A. 翘鼻头 B. 马头、蛇尾、瓦楞身 C. 当门子 D. 乌金衣 E. 通天眼

9. 属于麝香药材特征的是（ ）

10. 属于羚羊角药材特征的是（ ）

(11-12 题共用备选答案)

- A. 胆结石 B. 鳞甲 C. 干燥分泌物 D. 背甲及腹甲 E. 未骨化的密生茸毛的幼角

11. 牛黄的药用部位是（ ）

12. 龟甲的药用部位是（ ）

(13-14 题共用备选答案)

- A. 东马鹿茸 B. 西马鹿茸 C. 砍茸 D. 二茬茸 E. 花鹿茸

13. 外表皮红棕色或棕色，茸毛红黄色或黄棕色的是（ ）

14. 脑骨前端平齐，后端有一对弧形骨，习称“虎牙”的是（ ）

(15-16 题共用备选答案)

- A. 西藏、湖南、四川 B. 山东、辽宁、江苏 C. 西藏、四川、甘肃
D. 广东、上海、浙江 E. 吉林、辽宁、黑龙江

15. 麝香主产于（ ）

16. 地龙主产于（ ）

(17-21 题共用备选答案)

- A. 地龙 B. 羚羊角 C. 银柴胡 D. 蕲蛇 E. 防风

17. 具有“佛指甲”的是（ ）

18. 具有“翘鼻头”的是（ ）

19. 具有“合把”的是（ ）

20. 具有“砂眼”的是（ ）

21. 具有“蚯蚓头”的是（ ）

(22-26 题共用备选答案)

- A. 延胡索 B. 土鳖虫 C. 金银花 D. 大血藤 E. 大黄

22. “川军”是指（ ）

23. “红藤”是指（ ）

24. “双花”是指（ ）

25. “元胡”是指（ ）

26. “土元”是指（ ）

(27-31 题共用备选答案)

A. 0.03~0.06g B. 0.1~0.5g C. 0.3~0.6g D. 1.5~3g E. 3~6g

27. 马钱子的用量是 ()

28. 朱砂的用量是 ()

29. 斑蝥的用量是 ()

30. 全蝎的用量是 ()

31. 制川乌的用量是 ()

(32-35 题共用备选答案)

A. 单门 B. 二杠 C. 三岔 D. 四岔 E. 莲花

32. 马鹿茸具 1 个侧枝者习称 ()

33. 马鹿茸具 2 个侧枝者习称 ()

34. 花鹿茸具 1 个侧枝者习称 ()

35. 花鹿茸具 2 个侧枝者习称 ()

(36-38 题共用备选答案)

A. 病理产物 B. 生理产物 C. 干燥全体 D. 去掉内脏的干燥品 E. 动物骨骼

36. 僵蚕是 ()

37. 蜂蜜是 ()

38. 蜈蚣是 ()

(39-40 题共用备选答案)

A. 麝香 B. 乌梢蛇 C. 牛黄 D. 羚羊角 E. 鹿茸

39. “透甲”是哪个药材的鉴别术语 ()

40. “大挺”是哪个药材的鉴别术语 ()

矿物类药材

A1 型题

1. 矿物磨片的标准厚度为 ()

A. 0.3 μm B. 0.3mm C. 0.03cm D. 0.3cm E. 0.03mm

2. 矿物抵抗外来机械作用的能力称为 ()

A. 硬度 B. 挠性 C. 弹性 D. 脆性 E. 延展性

3. 朱砂主含 ()

A. 二硫化铁 B. 二硫化二砷 C. 硫酸铜 D. 硫化汞 E. 三硫化二砷

4. 雄黄的条痕色为 ()

A. 橙黄色 B. 黄棕色 C. 紫红色 D. 深红色 E. 淡橘红色

5. 对矿物类中药鉴别更具鉴别意义的颜色是 ()

A. 条痕色 B. 本色 C. 外色 D. 投射色 E. 假色

6. 炉甘石的主要化学成分为 ()

A. 碳酸钙 B. 磷酸钙 C. 碳酸锌 D. 氧化锌 E. 硫酸钠

7. 来源于硫酸盐类矿物的中药材是 ()

A. 赭石 B. 朱砂 C. 石膏 D. 雄黄 E. 滑石

8. 具绢丝样光泽的矿物药是 ()

A. 朱砂 B. 雄黄 C. 芒硝 D. 石膏 E. 白矾

9. 粉末用盐酸湿润后, 在光洁的铜片上磨擦, 能使铜片表面呈现银白色光洁的是 ()

A. 朱砂 B. 赭石 C. 自然铜 D. 雄黄 E. 石膏

10. 具有利尿通淋作用的矿物药是 ()

A. 石膏 B. 磁石 C. 朱砂 D. 滑石 E. 赭石

11. 燃烧时有大蒜样臭气的是 ()
 A. 信石 B. 赭石 C. 石膏 D. 硫黄 E. 雄黄
12. 下列矿物药中常含结晶水的是 ()
 A. 朱砂 B. 雄黄 C. 石膏 D. 自然铜 E. 赭石
13. 手触之易染成棕黄色的矿物类中药是 ()
 A. 雄黄 B. 赭石 C. 磁石 D. 朱砂 E. 硫黄
14. 下列中药忌火煅的是 ()
 A. 石膏 B. 朱砂 C. 炉甘石 D. 滑石 E. 赭石
15. 下列有毒的药材是 ()
 A. 石膏 B. 朱砂 C. 芒硝 D. 滑石 E. 赭石
16. 具有“钉头”的矿物类药材是 ()
 A. 朱砂 B. 白矾 C. 炉甘石 D. 自然铜 E. 赭石

B1 型题

(1-2 题共用备选答案)

- A. 滑石 B. 自然铜 C. 雄黄 D. 赭石 E. 磁石

1. 表面亮淡黄色，有金属光泽的药材是 ()
 2. 表面暗棕红色或灰黑色，有的具金属光泽的药材是 ()

(3-4 题共用备选答案)

- A. 碳酸锌 B. 氯化亚汞 C. 三氧化二铁 D. 四氧化三铁 E. 二硫化铁

3. 赭石主含 ()
 4. 磁石主含 ()

(5-6 题共用备选答案)

- A. “豆瓣砂” B. “夜明砂” C. “朱宝砂” D. “钉头” E. “镜面砂”

5. 呈粉末状或细小颗粒，色红明亮，有闪烁光泽，触之不染手的朱砂，习称 ()
 6. 呈粒状，方圆形或多角形，颜色发暗或灰褐色，质重而坚，不易碎的朱砂，习称 ()

(7-11 题共用备选答案)

- A. 绢丝样光泽 B. 金属光泽 C. 金刚石样光泽 D. 玻璃光泽 E. 蜡样光泽

7. 雄黄晶面 ()
 8. 自然铜 ()
 9. 滑石 ()
 10. 芒硝 ()
 11. 赭石 ()

(12-16 题共用备选答案)

- A. HgS B. FeS_2 C. As_2S_2 D. Fe_3O_4 E. Fe_2O_3

12. 雄黄主含 ()
 13. 磁石主含 ()
 14. 赭石主含 ()
 15. 朱砂主含 ()
 16. 自然铜主含 ()

岭南药

A1 型题

1. 根皮呈扭曲的条带状，强纤维性，具刺鼻辛臭气，味微苦、甘，嚼后有持久的灼热辛辣不适感的药材为 ()
 A. 葫芦茶 B. 了哥王 C. 火炭母 D. 千斤拔 E. 三桠苦

2. 呈圆柱形或似多个纺锤形连接在一起；表面黄白色或褐黄色，断面皮部灰白色，放射状纹理明显，纤维性，中间富粉性；味微甜的药材为（ ）
A. 葫芦茶 B. 了哥王 C. 牛大力 D. 千斤拔 E. 三桠苦
3. 益气而不生热，补气而不滋腻，扶正不碍邪，并有祛痰平喘、化湿行气功效，有“南芪”之称的药材为（ ）
A. 五指毛桃 B. 了哥王 C. 牛大力 D. 千斤拔 E. 三桠苦
4. 茎表面灰棕色或棕褐色，散有多数灰白色的类圆形点状皮孔，似秤星的药材为（ ）
A. 火炭母 B. 岗梅根 C. 牛大力 D. 千斤拔 E. 三桠苦
5. 茎呈圆柱形，有密集的淡褐色皮孔；三出掌状复叶，对生，纸质。揉之有香气，味极苦的药材为（ ）
A. 广东络石藤 B. 过岗龙 C. 广东海风藤 D. 三叉苦 E. 千斤拔
6. 花冠裂片呈旋转排列，下部合生成细管，雄蕊 5，花丝极短，气香，味微苦的药材为（ ）
A. 鸡蛋花 B. 旋覆花 C. 广东合欢花 D. 水翁花 E. 金盏银盘
7. 相互缠成团，灰绿色或棕褐色。茎细而多分枝，完整的叶片呈匙形，边缘有 3~5 个锯齿，微有香气，久嗅有刺激性的药材为（ ）
A. 田基黄 B. 倒扣草 C. 火炭母 D. 鹅不食草 E. 三丫苦
8. 下列哪味药材来源于伞形科（ ）
A. 鸡骨草 B. 积雪草 C. 半边莲 D. 鹅不食草 E. 火炭母
9. 下列哪味药材原植物不是来源于豆科的（ ）
A. 鸡骨草 B. 金盏银盘 C. 葫芦茶 D. 牛大力 E. 三丫苦
10. 叶互生，表面具灰白色“V”形斑块纹；具托叶膜质鞘状，抱茎的药材为（ ）
A. 田基黄 B. 积雪草 C. 半边莲 D. 火炭母 E. 鸡骨草
11. 断面呈纤维性，木部宽广，淡黄白色，同心环纹细密，多偏心，可见放射状纹理，皮部与木部易分离的药材为（ ）
A. 葫芦茶 B. 倒扣草 C. 火炭母 D. 独脚金 E. 九里香